

2024 年 1 月 “九省联考” 考后提升卷（广西卷）

高三化学

（考试时间：75 分钟 试卷满分：100 分）

注意事项：

- 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
- 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
- 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 O 16 Ca 40 Zn 65

第I卷

一、选择题：本题共 14 小题，每小题 3 分，共 42 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 广西新增了一批国家级非物质文化遗产代表性项目，如瑶族祝著节、柳州螺蛳粉制作技艺、北海贝雕、桂林米粉制作技艺等，下列说法错误的是

- A. 瑶族祝著节时制甜酒过程发生了化学反应
- B. 螺蛳粉的螺蛳汤香气四溢，体现了分子是运动的
- C. 贝雕所用贝壳的主要成分碳酸钙属于有机物
- D. 桂林米粉中含有的淀粉是一种天然高分子化合物

【答案】C

【解析】A. 制甜酒利用淀粉 $\xrightarrow{\text{水解}}$ 葡萄糖 $\xrightarrow{\text{酒化酶}}$ 乙醇，该过程发生化学反应，故 A 说法正确；

B. 香气四溢体现分子作无规则运动，故 B 说法正确；


C. 碳酸钙属于无机物，故 C 说法错误；

D. 淀粉属于多糖，是一种天然高分子化合物，故 D 说法正确；

答案为 C。

2. 反应 $\text{NaCl} + \text{CO}_2 \xrightarrow{\text{电解}} \text{CO} + \text{NaCl}$ 是我国科学家发明的低压高效电催化还原 CO_2 的新方法。下列有关说法


正确的是

- A. 氯离子的结构示意图为 


B. NaClO 的电子式为 $\text{Na}^+ [\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{:}]^-$

C. CO 是非极性分子

D. CO₂ 的结构式为



【答案】B

【解析】A. 氯原子得到 1 个电子形成氯离子，氯离子的结构示意图为 ，A 错误；

B. NaClO 为钠离子和次氯酸根离子形成的化合物，电子式为 $\text{Na}^+ [\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{:}]^-$ ，B 正确；

C. CO 分子中存在极性键，且正负电荷重心不重合，是极性分子，C 错误；

D. 二氧化碳的结构式为 O=C=O，D 错误；

故选 B。

3. 物质结构决定物质性质。下列性质总异与结构因素匹配错误的是

选项	性质差异	结构因素
A	CH ₃ CH ₃ 的沸点低于 CH ₃ CH ₂ Br 的沸点	晶体类型
B	CH ₃ CH ₂ OH 与水互溶，CH ₃ OCH ₃ 难溶于水	分子间氢键
C	CH ₄ 的沸点低于 CH ₃ CH ₂ CH ₃	分子间作用力
D	Na ₂ O 的熔点高于 Na ₂ S	离子半径

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】A

【解析】A. CH₃CH₃ 和 CH₃CH₂Br 均为分子晶体，CH₃CH₂Br 的沸点高的原因是卤素原子的相对原子质量大，A 错误；


B. CH₃CH₂OH 与水分子形成分子间氢键，而 CH₃OCH₃ 不能，B 正确；

C. CH₄ 的相对分子质量比 CH₃CH₂CH₃ 的相对分子质量比小，故分子间作用力小，沸点低，C 正确；

D. $r(\text{O}^{2-}) < r(\text{S}^{2-})$ ，Na₂O 的离子键比 Na₂S 的强，熔点高，D 正确；

故选 A。

4. 实验室利用 NH_3 、 SO_2 制备 NH_4HSO_3 晶体，下列实验装置和操作能达到实验目的的是



- A. 利用装置甲制备 SO_2 B. 利用装置乙制备 NH_3
- C. 利用装置丙制备 NH_4HSO_3 溶液 D. 利用装置丁蒸发获得 NH_4HSO_3 晶体

【答案】B

【解析】A. Cu 与浓硫酸反应制备 SO_2 需要加热，故 A 不符合题意；

B. 利用 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 和 NH_4Cl ，加热可制备 NH_3 ，故 B 符合题意；

C. 制备 NH_4HSO_3 溶液，应该 SO_2 过量，故 C 不符合题意；

D. NH_4HSO_3 受热会分解，蒸发无法获得 NH_4HSO_3 晶体，故 D 不符合题意；

故答案选 B。

5. X、Y、Z、W 为原子序数依次增大的短周期主族元素，X 的原子半径在短周期主族元素中最小，Y 的单质在空气中含量最大，Z 原子的最外层电子数是次外层电子数的 3 倍。W 与 Z 同主族。下列说法正确的是

- A. 第一电离能： $X < Y < Z$
- B. 分子的极性： $\text{YX}_3 < \text{WZ}_3$
- C. 同温下，同物质的量浓度水溶液的酸性： $\text{X}_2\text{WZ}_3 < \text{XYZ}_3$
- D. 键能： $\text{X}_2\text{Z} < \text{X}_2\text{W}$

【答案】C

【解析】A. 由题干信息可推出 X、Y、Z、W 四种元素分别为 H、N、O、S，元素第一电离能由小到大顺序为 $\text{H} < \text{S} < \text{O} < \text{N}$ ，即 $X < \text{W} < \text{Z} < \text{Y}$ ，A 项错误；


B. YX_3 、 WZ_3 分别为 NH_3 、 SO_3 ， NH_3 为极性分子， SO_3 为非极性分子，故分子极性： $\text{NH}_3 > \text{SO}_3$ ，即 $\text{YX} > \text{WZ}_3$ ，B 项错误；

C. 酸性: $\text{H}_2\text{SO}_3 < \text{HNO}_3$, C 项正确;

D. 非金属性: $\text{O} > \text{S}$, 故水中氢氧键的键能大于硫化氢中氢硫键的键能, D 项错误;

故选 C。

6. 有机物 M 具有优良的生理活性, 其结构简式如图所示。下列有关 M 的说法正确的是



A. 属于芳香烃

B. 可发生取代反应和加成反应

C. 1 个 M 分子中有 1 个手性碳原子

D. 1molM 最多消耗 4molNaOH

【答案】B

【解析】A. 烃是仅由碳、氢元素组成的有机化合物, 该有机物中还含有氧元素, 故 M 不属于芳香烃, A 项错误;

B. 该有机物中含有苯环, 可发生加成反应, 含羟基, 可发生取代反应, B 项正确;


C. 1 个 M 分子中含有 2 个手性碳原子, C 项错误;

D. 该有机物中含有 2 个酚羟基, 1molM 最多消耗 2molNaOH, D 项错误;

故选 B。

7. H_2O_2 在纸张漂白和废水处理等领域有重要应用。一定条件下用 H_2 和 O_2 合成 H_2O_2 的反应过程如图所示。

设 N_A 为阿伏加德罗常数的值, 下列说法正确的是



A. 1mol H_2O_2 中含 $2N_A\sigma$ 键, 不含 π 键

B. 合成 1mol H_2O_2 , 电子转移数为 $4N_A$

C. 1mol 的 H_2O_2 含 $18N_A$ 电子

D. 标准状况下, 4.48L H_2O_2 中含有 $0.2N_A\text{H}_2\text{O}_2$ 分子

【答案】C

【解析】A. $1\text{molH}_2\text{O}_2$ 中含 $3\text{mol}\sigma$ 键, 故为 $3N_A\sigma$ 键, A 错误;

B. 由图可知, 总反应为氢气和氧气在催化剂作用下生成过氧化氢: $\text{H}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{H}_2\text{O}_2$, 电子转化关系为:


$\text{H}_2\text{O}_2 \sim 2\text{e}^-$, 则合成 $1\text{molH}_2\text{O}_2$, 电子转移数为 $2N_A$, B 错误;

C. 1mol 的 H_2O_2 含 18mol 电子, 为 $18N_A$ 电子, C 正确;

D. 标况下过氧化氢不是气体, 不确定其物质的量, D 错误;

故选 C。

8. 高铁酸钠(Na_2FeO_4)是一种新型绿色消毒剂, 主要用于饮用水处理。某化学兴趣小组用废铁屑(主要成分为 Fe, 杂质有 Al、C 及油脂)制备高铁酸钠的主要流程如下。下列说法错误的是



A. “碱浸”可以除去废铁屑中的油脂

B. “滤渣”的主要成分是 Al 和 C

C. “操作I”通入的空气可以用 H_2O_2 溶液代替

D. 若流程改为先“氧化”后“调 pH”, 可能会生成 Cl_2

【答案】B

【分析】废铁屑(主要成分为 Fe, 杂质有 Al、C 及油脂)加 NaOH 碱浸, 可以除去废铁屑表面的油脂和 Al, 过滤后滤液中含有 $\text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4]$ 和油脂水解后的杂质, 固体中含有 Fe、C, 加盐酸酸浸, 过滤后滤渣为 C, 滤液为氯化亚铁溶液, 通入空气 Fe^{2+} 被氧化为 Fe^{3+} , 加 NaOH 调 pH 为碱性, NaClO 和 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 发生氧化还原反应得到 Na_2FeO_4 、NaCl, 并通过结晶分离出 Na_2FeO_4 。

【解析】A. 根据分析, “碱浸”可以除去废铁屑中的油脂, A 正确;

B. 根据分析, “滤渣”的主要成分是 C, B 错误;

C. 根据分析, “操作I”目的是将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} , 用 H_2O_2 也可以做氧化剂, 且不会引入杂质, 因此“操作I”通入的空气可以用 H_2O_2 溶液代替, C 正确;

D. 若先“氧化”, 溶液为酸性, Na_2FeO_4 在酸性条件下有较强的氧化性, 能将盐酸中的 Cl 氧化为 Cl_2 , D 正确;

故选 B。

9. 下列实验中, 对应的现象以及结论都正确且两者具有因果关系的是

	实验	现象	结论
A	向碳酸钠固体中加入少量水	白色粉末变成了晶体	Na_2CO_3 与 H_2O 发生化学反应
B	某粉末用酒精润湿后, 用玻璃棒蘸取做焰色试验	火焰呈黄色	该粉末一定含钠元素
C	将 K_2S 固体溶于水, 进行导电性实验	K_2S 溶液可导电	K_2S 中含有离子键
D	向 $10\text{ml } 0.2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 溶液中滴入 2 滴 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{MgCl}_2$ 溶液, 再滴加 2 滴 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{FeCl}_3$ 溶液	先产生白色沉淀 后再产生红褐色沉淀	$K_{\text{sp}}(\text{Mg}(\text{OH})_2) > K_{\text{sp}}(\text{Fe}(\text{OH})_3)$

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】A


【解析】A. 碳酸钠固体中加入少量水, 碳酸钠与水反应生成了碳酸钠晶体, 故白色粉末变成晶体, 碳酸钠粉末和碳酸钠晶体不是同一种物质, 发生了化学反应, A 正确;


B. 玻璃中含有硅酸钠, 属于钠盐, 用玻璃棒蘸取后做焰色试验, 火焰呈黄色, 不能证明溶液中含有钠离子, 应该用铂丝蘸取, B 错误;

C. 可溶性电解质的水溶液一定可以导电, 不一定是离子化合物, 因此无法得到 K_2S 中含有离子键的结论, C 错误;

D. 该实验中 NaOH 过量, 加入氯化镁先生成氢氧化镁白色沉淀, 再加入氯化铁, 多余的 NaOH 与氯化铁反应生成氢氧化铁红褐色沉淀, 不能说明氢氧化镁的 $K_{\text{sp}} >$ 氢氧化铁的 K_{sp} , D 错误;

故答案选 A。

10. 环氧乙烷(, 简称 EO)是一种重要的工业原料和消毒剂。由乙烯经电解制备 EO 的原理示意图如下, 下列说法中错误的是



- A. 电极 1 连接外接电源的正极
- B. 电极 2 的电极反应式为: $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{H}_2 \uparrow$
- C. 溶液 a 可能含有两种溶质, 溶液 b 可循环使用
- D. 离子膜可选择性的透过 H^+ 和 K^+

【答案】B

【分析】从图中可知, 电极 1 上 Cl^- 失电子生成 Cl_2 , 电极 1 为阳极, 生成的氯气与水反应生成 HClO , HClO 与 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ 反应生成 $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$, 电极 2 为阴极, 阴极上水得电子生成氢气和氢氧根离子, 钾离子可通过离子膜向下层移动, 溶液 a 为 KOH 和 KCl 的混合溶液, KOH 与 $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$ 反应生成环氧乙烷和 KCl 溶液, 溶液 b 为 KCl 溶液。

【解析】A. 电极 1 为阳极, 连接电源的正极, A 正确;

B. 电极 2 上水得电子生成氢气和氢氧根离子, 电极反应为 $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$, B 错误;

C. 溶液 a 可能含有 KCl 和 KOH 两种溶质, 溶液 b 为 KCl 溶液, 可循环使用, C 正确;

D. 电解质溶液中, 阳离子向阴极移动, 则钾离子和氢离子可通过离子膜向下层移动, D 正确;

故答案选 B。

11. 下列实验对应的离子方程式不正确的是

- A. 将碳酸氢钙溶液与过量的澄清石灰水混合: $\text{HCO}_3^- + \text{Ca}^{2+} + \text{OH}^- = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$
- B. 将少量 SO_2 通入 NaClO 溶液: $\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} + 2\text{ClO}^- = \text{SO}_3^{2-} + 2\text{HClO}$
- C. 用过量氨水吸收工业尾气中的 SO_2 : $2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2 = 2\text{NH}_4^+ + \text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$
- D. 向氨水中滴入少量硝酸银溶液: $\text{Ag}^+ + 2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ + 2\text{H}_2\text{O}$

【答案】B

【解析】A. 根据少定多变的原则可知, 将碳酸氢钙溶液与过量的澄清石灰水混合的离子方程式为:

$\text{HCO}_3^- + \text{Ca}^{2+} + \text{OH}^- = \text{CaCO}_3\downarrow + \text{H}_2\text{O}$, A 正确;

B. 由于 HClO 具有强氧化性, 可以把亚硫酸根氧化为硫酸根离子, 离子方程式为: $\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} + 3\text{ClO}^- = \text{SO}_4^{2-} + 2\text{HClO} + \text{Cl}^-$, B 错误;

C. 用过量氨水吸收工业尾气中的 SO_2 生成亚硫酸铵, 离子方程式为: $2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2 = 2\text{NH}_4^+ + \text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$, C 正确;

D. 向氨水中滴入少量硝酸银溶液生成二氨合银离子, 离子方程式为: $\text{Ag}^+ + 2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ + 2\text{H}_2\text{O}$, D 正确;

故选 B。

12. 砷化镉晶胞结构如图, 图 1 中“①”和“②”位是“真空”, 晶胞参数为 $a\text{pm}$, 建立如图 2, ①号位的坐标为 $(\frac{3}{4}, \frac{3}{4}, \frac{3}{4})$ 。已知: 砷化镉的摩尔质量为 $M\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$, N_A 为阿伏加德罗常数的值, 下列说法错误的是




图1

图2

A. 砷化镉中 Cd 与 As 原子个数比为 3: 2

B. 两个 Cd 原子间最短距离为 $0.5a\text{pm}$

C. ③号位原子坐标参数为 $(\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2})$

D. 该晶胞的密度为 $N_A(a \times 10^{-10})^3 \text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$

【答案】D

【解析】A. 由晶胞结构可知, 晶胞中位于体内的镉原子个数为 6, 位于顶点和面心的砷原子的个数为 $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$, 则镉与砷原子个数比为 3: 2, 故 A 正确;

B. 由晶胞结构可知, 两个镉原子间最短距离为边长的 $\frac{1}{2}$, 则最短距离为 $a\text{pm} \times \frac{1}{2} = 0.5a\text{pm}$, 故 B 正确;



C. 由位于体对角线 $\frac{1}{4}$ 处①号位的坐标为 $(\frac{3}{4}, \frac{3}{4}, \frac{3}{4})$ 可知, 晶胞的边长为 1, 则位于位于右侧面的面心上的③号位原子坐标参数为 $(\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2})$, 故 C 正确;

D. 由晶胞结构可知, 晶胞中位于体内的镉原子个数为 6, 位于顶点和面心的砷原子的个数为 $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$,


设晶体的密度为 $d \text{ g/cm}^3$, 由晶胞的质量公式可得: $\frac{2M}{N_A} = (10^{-10} \text{ a})^3 d$, 解得 $d = \frac{2M}{10^{-30} \text{ a}^3 N_A}$, 故 D 错误;

故选 D。

13. 工业上用乙苯与 CO_2 生产苯乙烯, 主要反应:



在一定压强和催化剂作用下, 向恒容容器中充入等物质的量的乙苯和 CO_2 。达到平衡时, 各物质的体积分数随温度的变化如图所示。



下列说法不正确的是

- A. 当反应混合气体的平均相对分子质量不再变化时, 反应达到化学平衡状态
- B. 苯乙烯和 H_2 的体积分数变化差异的主要原因是 CO_2 消耗 H_2
- C. 乙苯的平衡转化率随温度升高而升高, 宜采用 700°C 获得更多的苯乙烯
- D. 温度越高, 乙苯脱氢生成苯乙烯的反应的 K 越大

【答案】C

【解析】A. 在恒容容器中发生反应①、②, 只有气体物质反应及生成, 混合气体的质量不变, 反应①是气体分子数增大的反应, 随反应的进行, 气体物质的量增加, 混合气体的平均相对分子质量 $\bar{M} = \frac{m}{n}$ 减小, 当混合气体的平均相对分子质量不再变化时, 反应达到化学平衡状态, A 正确;

B. 发生反应①生成的苯乙烯和 H_2 的体积相等，相同温度时，苯乙烯的体积分数大于 H_2 的体积分数，说明 H_2 与 CO_2 发生反应②而被消耗，B 正确；


C. 温度升高到 $630^\circ C$ 左右时，苯乙烯的体积分数较大，温度继续升高，采用 $700^\circ C$ 获得更多的苯乙烯，苯乙烯的体积分数变化不明显，但耗能较大，故宜采用 $630^\circ C$ 获得较多的苯乙烯，C 错误；

D. 反应①，乙苯脱氢生成苯乙烯的反应为吸热反应，温度升高，平衡正向移动，化学平衡常数 K 增大，温度越高， K 越大，D 正确；

答案选 C。

14. 乙二胺($H_2NCH_2CH_2NH_2$)有类似于 NH_3 的性质。25 $^\circ C$ 时，向 0.01mol/L 乙二胺溶液中通入 HCl 气体，所得溶液(忽略溶液体积的变化)的 pH 与体系中含 N 微粒浓度的对数值($\lg c$)、反应物的物质的量之比

$t \left[t = \frac{n(HCl)}{n(H_2NCH_2CH_2NH_2)} \right]$ 关系如下图所示。下列有关说法正确的是



A. 图中曲线 Y 表示 $C_2H_9N_2^+$

B. P_3 所示溶液: $c(C_2H_{10}N_2^{2+}) + c(C_2H_9N_2^+) < c(Cl^-)$

C. P_4 所示溶液: $c(C_2H_{10}N_2^{2+}) + c(C_2H_9N_2^+) + c(C_2H_8N_2) = 2c(Cl^-)$

D. 图中 M 点对应的 $pH = 8.5$

【答案】B

【分析】由图可看出随 HCl 通入，曲线 Z 呈下降趋势，代表 $\lg c(H_2NCH_2CH_2NH_2)$ ，曲线 X 先增后减，代表 $\lg c(C_2H_9N_2^+)$ ，曲线 Y 呈逐渐增大趋势，代表 $\lg c(C_2H_{10}N_2^{2+})$ 。

【解析】A. 根据分析，随着盐酸的加入，曲线 Y 呈增大趋势，代表 $\lg c(C_2H_{10}N_2^{2+})$ 的变化趋势，A 错误；
B. 由图可知， P_3 所示溶液，氯化氢和乙二胺之比为 1.6 : 1，此时溶液中的成份为: $C_2H_{10}N_2Cl_2$ 和 $C_2H_9N_2Cl$ ，由于 $1mol C_2H_{10}N_2Cl_2$ 电离产生 $1mol C_2H_{10}N_2^{2+}$ 和 $2mol Cl^-$ ，则此时 $c(C_2H_{10}N_2^{2+}) + c(C_2H_9N_2^+) < c(Cl^-)$ ，B 正

确;

C. 由图可知, P_4 所示溶液, 氯化氢和乙二胺之比为 2:1, 此时溶液中的成份为 $C_2H_{10}N_2Cl_2$, 根据物料守恒可知, $2[c(C_2H_{10}N_2^{2+}) + c(C_2H_9N_2^+) + c(C_2H_8N_2)] = c(Cl^-)$, C 错误;

D. 乙二胺中, $K_{b1} = \frac{c(C_2H_9N_2^+) \times c(OH^-)}{c(C_2H_8N_2)}$, $K_{b2} = \frac{c(C_2H_{10}N_2^{2+}) \times c(OH^-)}{c(C_2H_9N_2^+)}$, 图中曲线 X 与曲线 Z 的交点

$c(C_2H_9N_2^+) = c(C_2H_8N_2)$, $pOH = pK_{b1} = 14 - 9.8 = 4.2$, 则 $K_{b1} = 10^{-4.2}$, 曲线 X 与 Y 的交点

$c(C_2H_{10}N_2^{2+}) = c(C_2H_9N_2^+)$, $pOH = pK_{b2} = 14 - 7.8 = 6.2$, 则 $K_{b2} = 10^{-6.2}$, 图中 M 点是曲线 Y 与 Z 的交点,

存在 $\lg c(H_2NCH_2CH_2NH_2) = \lg c(C_2H_{10}N_2^{2+})$, 则 $c(H_2NCH_2CH_2NH_2) = c(C_2H_{10}N_2^{2+})$, 故

$$K_{b1} \times K_{b2} = \frac{c(C_2H_9N_2^+) \times c(OH^-)}{c(C_2H_8N_2)} \times \frac{c(C_2H_{10}N_2^{2+}) \times c(OH^-)}{c(C_2H_9N_2^+)} = c^2(OH^-),$$

$c^2(OH^-) = 10^{-4.2} \times 10^{-6.2} = 10^{-10.4} (mol/L)^2$, $c(OH^-) = 10^{-5.2} mol/L$, $c(H^+) = 10^{-(14-5.2)} = 10^{-8.8} mol/L$, M 点


$pH = 8.8$, D 错误;

故选 B。

第II卷

二、非选择题: 本题共 4 小题, 共 58 分。

15. (14 分)《自然》杂志公布最新科学研究成果: 碘化镍(NiI_2)在二维形式上具有多铁性。某小组以废镍催化剂(主要成分是 Ni, 含少量 Zn、Fe、CaO、 SiO_2 等杂质)为原料制备碘化镍的流程如下:



请回答下列问题:

(1) 滤渣 1 的成分是 $CaSO_4$ 、_____(填化学式)。滤渣 2 经过洗涤、干燥、_____(填操作名称)可制铁红。


(2) “除铁”中可通过先加入 H_2O_2 溶液再加入 NiO 替代 $NaClO$ 溶液, H_2O_2 的作用是_____(用离子方程式表示)。

(3) “萃取”中, 萃取剂的密度小于 $1 g \cdot cm^{-3}$, 若在实验室中分离萃取液, 操作是_____(填操作名称)。

(4) “分解”过程中通入 N_2 的作用是_____。

(5)在空气中加热一定量的 $\text{NiC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 晶体,测得固体失重率(固体失重率

$= \frac{\text{原固体质量} - \text{剩余固体质量}}{\text{原固体质量}} \times 100\%$)与温度的关系如图所示, 300°C 发生反应的化学方程式为_____。



【答案】(1) SiO_2 灼烧

(2) $2\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ = 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{Fe}^{3+}$

(3)取下分液漏斗塞子,旋开活塞,放出下层液体,待下层液体刚好放完,立即关闭活塞,从上口倒出萃取液

(4)作为保护气,防止镍被空气中的氧气氧化

(5) $\text{NiC}_2\text{O}_4 \xrightarrow{300 \sim 400^\circ\text{C}} \text{NiO} + \text{CO}_2 \uparrow + \text{CO} \uparrow$

【分析】以废镍催化剂(主要成分是Ni,含少量Zn、Fe、CaO、 SiO_2 等杂质)为原料制备碘化镍,加硫酸“酸浸”,生成 NiSO_4 、 ZnSO_4 、 FeSO_4 、 CaSO_4 , CaSO_4 微溶于水、 SiO_2 不溶于硫酸,过滤出 CaSO_4 、 SiO_2 ,滤液中加 NaClO 把 Fe^{2+} 氧化为 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 除去铁,滤液中加 NH_4F 生成 CaF_2 沉淀除去 Ca^{2+} ,加萃取剂萃取出 Ni^{2+} ,加草酸铵得到 $\text{NiC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 晶体,在氮气条件下加热分解 $\text{NiC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 晶体得到金属镍,镍和碘单质反应生成 NiI_2 ,据此分析解题。

【解析】(1) SiO_2 不溶于硫酸, CaSO_4 微溶于水,所以滤渣1的成分是 CaSO_4 、 SiO_2 ;滤液中加 NaClO 把 Fe^{2+} 氧化为 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 除去,滤渣2是 $\text{Fe}(\text{OH})_3$,经过洗涤、干燥、灼烧, $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 分解可制铁红,故答案为 SiO_2 ;灼烧。


(2)“除铁”中可通过先加入 H_2O_2 溶液再加入 NiO 替代 NaClO 溶液, H_2O_2 的作用是把 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} ,反应的离子方程式为 $2\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ = 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{Fe}^{3+}$,故答案为 $2\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ = 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{Fe}^{3+}$ 。

(3)萃取“中,萃取剂的密度小于 $1\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$,萃取液在上层,若在实验室中分离萃取液,具体操作是:取下分液漏斗塞子,旋开活塞,放出下层液体,待下层液体刚好放完,立即关闭活塞,从上口倒出萃取液,故答案为取下分液漏斗塞子,旋开活塞,放出下层液体,待下层液体刚好放完,立即关闭活塞,从上口倒出萃取液。


(4)“分解”过程中通入 N_2 的作用是作为保护气,防止镍被空气中的氧气氧化,故答案为作为保护气,防止

镍被空气中的氧气氧化。

(5) 设有 $1\text{mol NiC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 晶体, 质量为 183g , 加热到 300°C 失重率 19.76% , 质量为 36g , 则晶体完全失去结晶水; $300\sim 400^\circ\text{C}$ 失重率 59.02% , 则剩余固体的质量为 75g , 其中有 1mol Ni 元素, 则氧元素的物质的量为 $\frac{75\text{g}-59\text{g}}{16\text{g/mol}}=1\text{mol}$, 所以所得固体为 NiO , $300\sim 400^\circ\text{C}$ 发生反应的化学方程式为




16. (14 分) 晶体硅材料是最主要的光伏材料, 随当前信息工程的发展, 硅主要用于微电子技术。工业上将粗硅氯化、精馏后得到 SiCl_4 和 SiHCl_3 的混合物然后用 H_2 还原得到高纯硅。还原过程中发生的主要反应为:



回答下列问题:

(1) 已知: $2\text{SiHCl}_3(\text{g}) \rightleftharpoons \text{SiCl}_4(\text{g}) + \text{SiH}_2\text{Cl}_2(\text{g}) \quad \Delta H_3 = +48\text{kJ/mol}$, $\text{H}_2(\text{g})$ 还原 $\text{SiCl}_4(\text{g})$ 生成 $\text{SiH}_2\text{Cl}_2(\text{g})$ 的热化学方程式为_____。

(2) 在 T_1 、 T_2 温度下, 将 $1\text{mol SiCl}_4(\text{g})$ 、 $1\text{mol SiHCl}_3(\text{g})$ 和 $3\text{mol H}_2(\text{g})$ 分别加入体积固定的密闭容器中, 在催化条件下发生反应 i、ii。测得 H_2 的转化率及体系内的压强随时间的变化关系如图所示。



① T_2 温度下, 反应达到平衡时 $\text{SiHCl}_3(\text{g})$ 的转化率_____。

② T_2 温度下, 反应 i 的标准平衡常数 K^θ 的计算式为_____。(已知: 分压=总压 $\times$ 该组分物质的量分数,

对于反应 $d\text{D}(\text{g}) + e\text{E}(\text{g}) \rightleftharpoons g\text{G}(\text{g}) + h\text{H}(\text{g})$ 的 $K^\theta = \frac{\left(\frac{p_{\text{G}}}{p^\theta}\right)^g \left(\frac{p_{\text{H}}}{p^\theta}\right)^h}{\left(\frac{p_{\text{D}}}{p^\theta}\right)^d \left(\frac{p_{\text{E}}}{p^\theta}\right)^e}$, 其中 $p^\theta = 10^6\text{Pa}$, p_{G} 、 p_{H} 、 p_{D} 、 p_{E} 为各组

分的平衡分压)。

③ ΔH_2 _____ 0(填“>”或“<”), 写出推理过程_____。

(3)研究发现, 反应 $\text{SiCl}_4(\text{g}) + \text{SiH}_2\text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SiHCl}_3(\text{g})$ 的活化能 $E_a = 100\text{kJ/mol}$ 。反应的活化能 E_a 、速率常

数 k 、温度 T 满足关系: $\ln \frac{k(T_2)}{k(T_1)} = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) = -\frac{\Delta E_a}{RT}$ 。

已知: $R = 8.3 \times 10^{-3} \text{kJ}/(\text{mol} \cdot \text{K})$; $\ln 10 = 2.3$

①若 $T_1 = 300\text{K}$, 通过升高温度到 595K , 才能满足 $\frac{k_2}{k_1} = 10^8$ 以加快反应速率;

②若 $T = 300\text{K}$, 使用催化剂使活化能降低, 满足 $\frac{k_2}{k_1} = 10^8$ 以加快反应速率, E_a 应减小。

上述②中 E_a 应减小 _____ kJ/mol (保留 1 位小数); 对比①和②你得到的结论是_____。

【答案】(1) $\text{SiCl}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{SiH}_2\text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{HCl}(\text{g}) \quad \Delta H = (2a - 2b + 48)\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

(2) 80% $\frac{\left(\frac{5.6}{6.6} \times 1.32\right)^4}{\frac{0.2}{6.6} \times 1.32 \times \left(\frac{0.6}{6.6} \times 1.32\right)^2} < T_2 > T_1$, T_2 时 $\text{SiHCl}_3(\text{g})$ 的转化率为 80%, T_1 温度下

$\text{SiHCl}_3(\text{g})$ 的转化率是 90%, 降低温度, $\text{SiHCl}_3(\text{g})$ 转化率升高, 反应ii是放热反应, $\Delta H_2 < 0$

(3) 45.8 生产中提高反应速率, 研制催化剂比提高反应温度更有意义

【解析】(1) $\text{H}_2(\text{g})$ 还原 $\text{SiCl}_4(\text{g})$ 生成 $\text{SiH}_2\text{Cl}_2(\text{g})$ 的化学方程式为 $\text{SiCl}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{SiH}_2\text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{HCl}(\text{g})$,

已知① $\text{SiCl}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{Si}(\text{s}) + 4\text{HCl}(\text{g}) \quad \Delta H_1 = a\text{kJ/mol}$; ② $\text{SiHCl}_3(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{Si}(\text{s}) + 3\text{HCl}(\text{g})$

$\Delta H_2 = b\text{kJ/mol}$ ③ $2\text{SiHCl}_3(\text{g}) \rightleftharpoons \text{SiCl}_4(\text{g}) + \text{SiH}_2\text{Cl}_2(\text{g}) \quad \Delta H_3 = +48\text{kJ/mol}$, 由盖斯定律可知(反应①-反应②)+

反应③可得反应 $\text{SiCl}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{SiH}_2\text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{HCl}(\text{g})$, 则反应的


$\Delta H = 2(\Delta H_1 - \Delta H_2) + \Delta H_3 = (2a - 2b + 48)\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 因此 $\text{H}_2(\text{g})$ 还原 $\text{SiCl}_4(\text{g})$ 生成 $\text{SiH}_2\text{Cl}_2(\text{g})$ 的热化学方程式为

$\text{SiCl}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{SiH}_2\text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{HCl}(\text{g}) \quad \Delta H = (2a - 2b + 48)\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

(2) ①由图象可知, T_2 温度下, 反应达到平衡时 H_2 的转化率为 80%, 则消耗 H_2 的物质的量为 2.4mol , 设消耗 $\text{SiCl}_4(\text{g})$ 的物质的量为 x , 消耗 SiHCl_3 的物质的量为 y , 则列三段式有:

	$\text{SiCl}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{Si}(\text{s}) + 4\text{HCl}(\text{g})$		
起始(mol)	1	3	0
转化(mol)	x	2x	4x
平衡(mol)	1-x	3-2x	4x

	$\text{SiHCl}_3(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{Si}(\text{s}) + 3\text{HCl}(\text{g})$		
起始(mol)	1	3	0
转化(mol)	y	y	3y
平衡(mol)	1-y	3-y	3y



则有 $2x+y=2.4$ ，又 T_2 温度下，达到平衡时的压强为 $1.32 \times 10^6 \text{Pa}$ ，起始压强为 $1.0 \times 10^6 \text{Pa}$ ，则

$\frac{(1-x)+(1-y)+0.6+4x+3y}{1+1+3} = \frac{1.32 \times 10^6}{1.0 \times 10^6}$ ，化简为 $3x+2y=4$ ，解得 $x=0.8$ ， $y=0.8$ ，因此达到平衡时 SiHCl_3 的转化率为 $\frac{0.8 \text{mol}}{1 \text{mol}} \times 100\% = 80\%$ ；

②由①可知， T_2 温度下，达到平衡时 $n(\text{SiCl}_4)=n(\text{SiHCl}_3)=0.2 \text{mol}$ ， $n(\text{H}_2)=0.6 \text{mol}$ ， $n(\text{HCl})=(3.2+2.4)=5.6 \text{mol}$ ，

则反应 i 的标准平衡常数 $K^\theta = \frac{\left(\frac{5.6}{6.6} \times 1.32\right)^4}{\frac{0.2}{6.6} \times 1.32 \times \left(\frac{0.6}{6.6} \times 1.32\right)^2}$ ；

③结合①计算可得， T_1 温度下， SiHCl_3 的转化率为 90%，而 T_2 温度下 $\text{SiHCl}_3(\text{g})$ 的转化率为 80%，根据图象， T_2 温度下反应先达到平衡，因此 $T_2 > T_1$ ，则 $T_2 \rightarrow T_1$ 为降低温度， $\text{SiHCl}_3(\text{g})$ 转化率升高，因此反应 ii 是放热反应，即 $\Delta H_2 < 0$ 。


(3) 上述②中，若 $T=300\text{K}$ ，使用催化剂使活化能降低，满足 $\frac{k_2}{k_1}=10^8$ 以加快反应速率，此时 $\ln 10^8 = -\frac{\Delta E_a}{300R}$ ，则，因此 E_a 应减小 45.8kJ/mol ，上述①中，升高温度到 595K ，满足 $\frac{k_2}{k_1}=10^8$ 以加快反应速率，此时

$\ln 10^8 = \frac{E_{a1}}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) = \frac{\Delta E_{a1}}{R} \left(\frac{1}{300} - \frac{1}{595} \right)$ ，则 $E_{a1} = \frac{\ln 10^8 R}{\left(\frac{1}{300} - \frac{1}{595} \right)} \approx 91.6 \text{kJ/mol}$ ， E_a 增大，因此生产中提高反应速率，研制催化剂比提高反应温度更有意义。

17. (15 分) 一水硫酸四氨合铜 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}]$ 是一种易溶于水的晶体，可作高效安全的广谱杀菌剂。

回答下列问题

I. 制备少量晶体 $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，设计实验方案如下：



(1) 仪器 A 的名称为____，对比铜和浓硫酸加热制备硫酸铜，该方案的优点是_____。


(2) 利用溶液 C 制备“产物晶体”时，需用玻璃棒摩擦试管内壁的目的是_____。

II. 氨含量的测定。精确称取 $m \text{ g}$ 晶体，加适量水溶解，注入如图所示的三颈瓶中，然后逐滴加入

$V \text{ mL } 10\% \text{ NaOH}$ 溶液，通入水蒸气，将样品液中的氨全部蒸出，并用蒸馏水冲洗导管内壁，用 $V_1 \text{ mL } c_1 \text{ mol/L}$

的盐酸标准溶液完全吸收。取下接收瓶，用 $c_2 \text{ mol/L NaOH}$ 标准溶液滴定过剩的 HCl ，到终点时消耗

$V_2 \text{ mL NaOH}$ 溶液。



氨的测定装置

(3) “玻璃管 2”的作用____，样品中氨的质量分数的表达式_____。

III. 探究四氨合铜离子的性质

用所得晶体配成水溶液，取三份 1 mL 试样，分别加入 0.5 mL 的水、稀硫酸、氢氧化钠溶液，实验现象记录如下：

加入试剂	水	稀硫酸	氢氧化钠
现象	几乎无变化	溶液颜色变成浅蓝色，与同浓度硫酸铜颜色相当	

(4) 上述实验现象与配位离子的解离平衡有关，请用适当的化学用语表示该配位离子的解离平衡____，则加入氢氧化钠溶液后的现象为_____。

【答案】(1) 坩埚 没有 SO_2 生成，更环保且硫酸利用率高

(2) 充当晶种，诱导结晶

(3) 平衡气压，防止堵塞和倒吸 $\frac{17 \times (c_1 V_1 - c_2 V_2) \times 10^{-3}}{m} \times 100\%$

(4) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+} + 4\text{NH}_3$ 有蓝色沉淀生成，静置后，上层溶液颜色变浅或变为无色

【分析】Cu 在坩埚中加热生成 CuO，CuO 溶于硫酸生成硫酸铜溶液，硫酸铜溶液中滴加氨水生成氢氧化铜悬浊液，继续滴加氨水至沉淀完全溶解生成 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 溶液，最后经过蒸发浓缩、冷却结晶等操作得到一水硫酸四氨合铜。



【解析】(1) 仪器 A 的名称为坩埚，铜与浓硫酸直接加热制备硫酸铜，会有 SO_2 生成，不仅不环保而且硫酸利用率低，此方案没有 SO_2 生成，更环保且硫酸利用率高。

(2) 利用 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 溶液制备一水硫酸四氨合铜时，需要用玻璃棒摩擦试管内壁，目的是充当晶种，诱导结晶。

(3) 氨气极易溶于水，与盐酸反应时容易发生倒吸，玻璃管 2 的作用为平衡气压，防止堵塞和倒吸。消耗 NaOH 的物质的量为 $c_2 V_2 \times 10^{-3} \text{mol}$ ，则与 NaOH 反应的 HCl 有 $c_2 V_2 \times 10^{-3} \text{mol}$ ，则与氨气反应的 HCl 有 $c_1 V_1 \times 10^{-3} \text{mol} - c_2 V_2 \times 10^{-3} \text{mol}$ ，生成氨气 $(c_1 V_1 \times 10^{-3} - c_2 V_2 \times 10^{-3}) \text{mol}$ ，氨气的质量为 $17(c_1 V_1 \times 10^{-3} - c_2 V_2 \times 10^{-3}) \text{g}$ ，则氨的质量分数表达式为 $\frac{17 \times (c_1 V_1 - c_2 V_2) \times 10^{-3}}{m} \times 100\%$ 。

(4) 加入稀硫酸时溶液颜色变为浅蓝色，与同浓度硫酸铜颜色相当，说明硫酸与 NH_3 发生了反应，则四氨合铜配离子的解离平衡方程式为 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+} + 4\text{NH}_3$ ，加入氢氧化钠溶液， Cu^{2+} 转化为氢氧化铜沉淀，该解离平衡正向移动，故现象为有蓝色沉淀生成，静置后，上层溶液颜色变浅或变为无色。



18. (14 分) 多环化合物是合成很多药物的中间体，下面是一种多环化合物 G 的合成路线：




回答下列问题：


(1) A 的分子式为_____，A 侧链上的碳原子的杂化类型有_____。


(6)结合题中相关信息,设计以  和  为原料制备  的合成路线_____ (其他无机试剂任选)。


B()和 KHCO_3 ; B 与 C()在 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}/\text{OH}^-$ 作用下发生加成反应, 生成




); 由 D 的结构简式、F 的分子式, 可确定 F 的结构简式为






; 由 G 的分子式及 F 的结构简式, 可确定 G 为 。

【解析】(1) 由分析可知, A 的结构简式为 , 则其分子式为: $C_8H_5O_2N_4$, A 侧链上, -CN

中的碳原子的价层电子对数为 2, 发生 sp 杂化、-COOH 中碳原子的价层电子对数为 3, 发生 sp^2 杂化。








C_2H_5OH/OH -作用下发生加成反应。



(4) C 的同分异构体中, 同时满足以下两个条件: ”i. 除苯环外不含其他的环状结构; ii. 能发生银镜反应”的有机物, 分子中含有苯环、-CHO、-CH=CH-, 可能是苯环上连有 1 个取代基 -CH=CH-CHO(有顺反异构体, 2 种)、-C(CHO)=CH₂; 可能是苯环上连有 2 个取代基, -CHO、-CH=CH₂ 分别位于苯环的邻、间、对位, 共 3 种, 所以共有 6 种(考虑烯烃的立体异构)。

(5) 由分析可知, G 的结构简式为



(6) 以  和  为原料制备  时, 需将  转化为

$\text{HOCH}_2\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{OH}$, 也就是应将  与 Br_2 发生 1, 4-加成, 再水解, 所以合成路线为

