

密云二中 2023-2024 学年度第一学期期中考试

高二年级化学学科选考试卷

试卷说明	1. 本试卷共 14 页，分为两个部分。第一部分（选择题）21 道小题，共 42 分；第二部分（非选择题）5 道大题，共 58 分。 2. 考试时间为 90 分钟，全卷共 100 分。请将答案填写在答题卡的相应位置，必须用黑色字迹的笔作答。
------	---

可能用到的相对原子质量：

H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 Mg-24 S-32 Cl-35.5 Mn-55 Fe-56 Cu-64

第一部分 选择题（共 42 分）

请在每小题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

1. 下列发电站在发电过程中实现化学能转化为电能的是

A. 三峡水利发电站	B. 甘肃酒泉风电基地	C. 大亚湾核电站	D. 上海虹桥垃圾焚烧发电厂
			

2. 将下列物质溶于水，能促进水的电离的是（ ）

A. Na_2CO_3

B. NaHSO_4

C. SO_2

D. NaOH

3. 下列说法中，能够解释 CH_3COOH 溶液呈酸性的是（ ）

A. CH_3COOH 中含氢元素

B. CH_3COOH 电离使溶液中 $c_{\text{平}}(\text{H}^+) > c_{\text{平}}(\text{OH}^-)$

C. CH_3COOH 能电离出 H^+

D. CH_3COOH 能促使水电离出更多的 H^+

4. 2022 年 3 月，神舟十三号航天员在中国空间站进行了“天宫课堂”授课活动。其中太空“冰雪实验”演示了过饱和醋酸钠溶液的结晶现象。下列说法不正确的是（ ）


A. 醋酸钠是强电解质

B. 常温下，醋酸钠溶液的 $\text{pH} > 7$

C. 醋酸钠溶液中 $c(\text{Na}^+) = c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$

D. 该溶液中加入少量醋酸钠固体可以促进醋酸钠晶体析出

5. 下列实验操作时，选用的仪器不正确的是（ ）

选项	A	B	C	D
操作	浓缩 NaCl 溶液	配制 500mL 一定物质的量浓度的 NaCl 溶液	量取 25.00mL 0.1000mol·L ⁻¹ 的 NaOH 溶液	向上排空气法收集 Cl ₂
仪器				

6. 下列条件下，可以大量共存的离子组是（ ）

- A. 某无色透明溶液中：Na⁺、Cu²⁺、SO₄²⁻、OH⁻
 B. 含有大量 CH₃COO⁻ 的溶液中：H⁺、K⁺、SO₄²⁻、NO₃⁻
 C. 0.1mol/L 的 H₂SO₄ 溶液中：K⁺、Ba²⁺、Cl⁻、NO₃⁻
 D. pH = 11 的溶液中：Na⁺、K⁺、Cl⁻、CO₃²⁻

7. 饱和二氧化硫水溶液中存在下列平衡体系：SO₂ + H₂O ⇌ H⁺ + HSO₃⁻，HSO₃⁻ ⇌ H⁺ + SO₃²⁻，向此溶液中的下列说法中正确的是（ ）

- A. 加水，SO₃²⁻ 浓度增大
 B. 通入少量 Cl₂ 气体，溶液 pH 增大
 C. 加少量 NaOH 粉末，SO₃²⁻ 浓度增大
 D. 室温下将溶液的温度升高到 50℃，溶液 pH 减小


8. 下列实验中的颜色变化与氧化还原反应无关的是（ ）

	A	B	C	D
实验	KI 溶液滴入 AgCl 浊液中	SO ₂ 通入 Na ₂ S 溶液中	SO ₂ 通入 KMnO ₄ 溶液中	NO 进入空气中
现象	沉淀由白色逐渐变为黄色	产生淡黄色沉淀	溶液褪色	变为红棕色气体

9. 下列解释事实的化学方程式或离子方程式不正确的是（ ）

- A. 在燃煤时加入适量石灰石，可减少 SO₂ 的排放：2CaCO₃ + O₂ + 2SO₂ = 2CaSO₃ + 2CO₂
 B. 用食醋除去暖水瓶中的水垢：2CH₃COOH + CaCO₃ = Ca²⁺ + 2CH₃COO⁻ + CO₂↑ + H₂O
 C. 自然界各种原生铜的硫化物经氧化、淋滤作用后产生的硫酸铜，遇到难溶的 PbS，慢慢转变为铜蓝（CuS）：Cu²⁺ + SO₄²⁻ + PbS = CuS + PbSO₄

D. 在盐碱地（含较多 NaCl 、 Na_2CO_3 ）上通过施加适量 CaSO_4 ，可降低土壤的碱性：



10. 已知反应：① $\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{F}_2(\text{g}) = \text{CH}_2\text{F}_2(\text{g}) + 2\text{HF}(\text{g}) \quad \Delta H_1 < 0$



相关化学键的键能数据如下：

化学键	C-H	C-F	H-F	F-F
键能/(kJ/mol)	a	b	c	d

下列说法正确的是

A. ①中反应物的总能量小于生成物的总能量

B. $\Delta H_1 = 2(b - a + c - d) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

C. $\Delta H_2 = \frac{1}{2} \Delta H_1$

D. $\text{CH}_2\text{F}_2(\text{g}) + 2\text{F}_2(\text{g}) = \text{CF}_4(\text{g}) + 2\text{HF}(\text{g}) \quad \Delta H = \Delta H_2 - \Delta H_1$

11. ICl 与 H_2 能发生反应： $\text{H}_2(\text{g}) + 2\text{ICl}(\text{g}) = \text{I}_2(\text{g}) + 2\text{HCl}(\text{g}) \quad \Delta H < 0$

已知：①该反应由两个基元反应分步完成，第一步： $\text{H}_2 + \text{ICl} = \text{HI} + \text{HCl}$ 。

②两步反应的活化能分别为 E_{a1} 、 E_{a2} ，且 $E_{a1} > E_{a2}$ 。

下列判断正确的是（ ）

A. 第一步反应不是氧化还原反应


B. 已知键能： $\text{H-H} > \text{I-I}$ ，可推知键能： $\text{H-Cl} > \text{I-Cl}$

C. 第一步的化学反应速率大于第二步的化学反应速率

D. 第二步的化学方程式为 $\text{HI} + \text{ICl} = \text{I}_2 + \text{HCl}$

12. 汽车尾气处理存在反应： $\text{NO}_2(\text{g}) + \text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{NO}(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g})$ ，该反应过程及能量变化如下

图所示：



下列说法正确的是 ()

- A. 升高温度, 平衡正向移动
- B. 使用催化剂可以有效提高反应物的平衡转化率
- C. 反应物转化为活化配合物需要吸收能量
- D. 该反应生成了具有非极性共价键的 CO_2

13. 下列实验事实不能用平衡移动原理解释的是 ()


A.

温度 $t/^\circ\text{C}$	25	50	100
水的离子积常数 $K_w/10^{-14}$	1.01	5.47	55.0


B.

$c(\text{盐酸})/(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$	0.1	0.01
pH	1	2


C.



D.



14. 某 MOFs 多孔材料孔径大小和形状恰好将 N_2O_4 “固定”, 能高选择性吸附 NO_2 。废气中的 NO_2 被吸附后, 经处理能全部转化为 HNO_3 。原理示意图如下。




已知: $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g}) \quad \Delta H > 0$

下列说法不正确的是 ()


- A. 温度升高时利于 NO_2 吸附
- B. 多孔材料“固定” N_2O_4 , 促进 $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 平衡正向移动
- C. 转化为 HNO_3 的反应是 $2\text{N}_2\text{O}_4 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{HNO}_3$
- D. 每获得 0.1mol HNO_3 时, 转移电子的数目为 6.02×10^{22}

15. 常温下，向20mL $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{CH}_3\text{COOH}$ 溶液中逐滴加入 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的NaOH溶液，滴入NaOH溶液的体积与溶液pH的变化关系如图所示。下列说法正确的是（ ）



- A. a点的 $\text{pH} = 1$
- B. b点时， $c(\text{CH}_3\text{COO}^-) = 0.05\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- C. c点时， $V(\text{NaOH}) = 20\text{mL}$
- D. 反应过程中 $\frac{c(\text{CH}_3\text{COO}^-)}{c(\text{CH}_3\text{COOH})}$ 的值不断增大

16. 实验测得 $0.6\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{CH}_3\text{COONa}$ 溶液的pH、温度随时间变化的曲线如图所示，下列说法不正确的是（ ）



- A. 随温度升高，纯水中 $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$
 - B. 随温度升高， CH_3COONa 溶液的 $c(\text{OH}^-)$ 减小
 - C. CH_3COONa 溶液存在水解平衡： $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$
 - D. 随温度升高， CH_3COONa 溶液的pH变化是 K_w 改变与水解平衡移动共同作用的结果
17. 以 $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}(\text{蓝}) + 4\text{Cl}^- \rightleftharpoons [\text{CuCl}_4]^{2-}(\text{黄}) + 4\text{H}_2\text{O} \quad \Delta H > 0$ 为例，探究影响平衡移动的因素。取相同浓度的 CuCl_2 溶液，分别进行下列实验，对实验现象的分析不正确的是（ ）

	操作和现象	分析
A	观察溶液为绿色	$[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$ 和 $[\text{CuCl}_4]^{2-}$ 同时存在
B	升高温度, 溶液变为黄绿色	平衡正移, $[\text{CuCl}_4]^{2-}$ 的浓度增大
C	加几滴 AgNO_3 溶液, 静置, 上层清液为蓝色	平衡逆移, $[\text{CuCl}_4]^{2-}$ 的浓度减小
D	加少量 Zn 片, 静置, 上层清液为浅黄绿色	平衡正移, $[\text{CuCl}_4]^{2-}$ 的浓度增大


18. 2022 北京冬奥会期间, 赛区内使用了氢燃料清洁能源车辆, 某氢氧燃料电池工作如图所示。下列说法不正确的是 ()

A. 电极 a 为电池的负极


B. 电极 b 表面反应为: $\text{O}_2 + 4\text{e}^- + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{OH}^-$

C. 电池工作过程中 K^+ 向负极迁移

D. 氢氧燃料电池将化学能转化为电能的转化率高于火力发电, 提高了能源利用率



19. 为研究沉淀的生成及转化, 同学们进行下图所示实验。



下列关于该实验的分析不正确的是 ()


A. 上述实验不能证明 AgSCN 向 AgI 沉淀转化反应的发生

B. ①中产生白色沉淀的原因是 $c(\text{Ag}^+) \cdot c(\text{SCN}^-) > K_{\text{sp}}(\text{AgSCN})$



C. ①中存在平衡: $\text{AgSCN}(s) \rightleftharpoons \text{Ag}^+(aq) + \text{SCN}^-(aq)$

D. ②中无明显变化是因为溶液中的 $c(\text{SCN}^-)$ 过低



20. 丙烷经催化脱氢可制丙烯: $\text{C}_3\text{H}_8 \rightleftharpoons \text{C}_3\text{H}_6 + \text{H}_2$ 。600°C, 将一定浓度的 CO_2 与固定浓度的 C_3H_8 通过含催化剂的恒容反应器, 经相同时间, 流出的 C_3H_6 、 CO 和 H_2 浓度随初始 CO_2 浓度的变化关系如图。



已知：



下列说法不正确的是 ()



C. 其他条件不变，投料比 $c(\text{CO}_2) / c(\text{C}_3\text{H}_8)$ 越大， C_3H_8 转化率越大

D. 若体系只有 C_3H_6 、 CO 、 H_2 和 H_2O 生成，则初始物质浓度 c_0 与流出物质浓度 c 之间一定存在： $3c_0(\text{C}_3\text{H}_8) + c_0(\text{CO}_2) = c(\text{CO}) + c(\text{CO}_2) + 3c(\text{C}_3\text{H}_6)$

21. 某小组同学设计如下实验能证实反应 $2\text{Fe}^{3+} + 2\text{I}^- \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{2+} + \text{I}_2$ 为可逆反应。已知 FeF_6^{3-} 是一种无色的稳定的络离子。

实验装置	实验序号	实验操作和现象
注：a、b 均为石墨电极。	①	i. 闭合 K，指针向右偏转 ii. 待指针归零，向 U 形管左管中加入 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KI 溶液，……
	②	i. 闭合 K，指针向右偏转 ii. 待指针归零，向 U 形管左管中滴加 $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ AgNO_3 溶液，指针向左偏转

下列说法不正确的是 ()

A. 电流表指针归零，说明上述可逆反应达到了化学平衡状态


- B. ①中加入 KI 溶液后, 上述平衡向正反应方向移动, 电流表指针向右偏转
- C. ②中加入 AgNO_3 溶液后, 导致氧化性: $\text{Fe}^{3+} > \text{I}_2$, 上述平衡向逆反应方向移动
- D. ②中电流表指针再次归零时, 向 U 型管右管滴加饱和 NH_4F 溶液, 电流表指针向左偏转

第二部分 非选择题 (共 58 分)

22. (10 分) 依据醋酸的性质, 请回答下列问题(以下讨论均在常温时)。

(1) 冰醋酸稀释过程中溶液的导电能力变化如图所示。

测得物质的量浓度为 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CH}_3\text{COOH}$ 溶液, $\text{pH} \approx 2.88$ 。




① CH_3COOH 的电离方程式是_____。

② a、b、c 三点中 pH 最小的是_____ (填字母序号, 下同);

CH_3COOH 的电离程度最大的是_____。

③ 在稀释过程中, $\frac{c(\text{CH}_3\text{COO}^-)}{c(\text{CH}_3\text{COOH})}$ 的变化趋势是_____。

(2) 向相同的两密闭容器中加入 0.05g 镁条, 分别注入 2mL 2mol/L 盐酸、2mL 2mol/L 醋酸, 测得容器内压强随时间变化如下图所示。




① 反应为醋酸的曲线是_____。

② 反应开始时, 反应速率 $a > b$ 的原因是_____。

(3) 查资料: 25°C 时, $\text{CH}_3\text{COOH } K_a = 1.8 \times 10^{-5}$, $\text{HCN } K_a = 6.2 \times 10^{-10}$, $\text{HClO } K_a = 4.0 \times 10^{-8}$ 。推测 25°C 时下列反应可能发生的是_____。

- a. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaCN} = \text{CH}_3\text{COONa} + \text{HCN}$
- b. $\text{NaClO} + \text{HCN} = \text{HClO} + \text{NaCN}$
- c. $\text{HClO} + \text{CH}_3\text{COONa} = \text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaClO}$

(4)向20 mL $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 CH_3COOH 溶液中滴加 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液，测得溶液pH变化如图。




①C点表示的溶液中，各离子浓度由大到小的顺序是_____。

②A、B、C、D点表示的溶液中，由水电离出的 $c(\text{OH}^-)$ 最大的是_____。


23.(13分)我国“十四五”规划提出要制定2030年前碳达峰行动方案，努力争取2060年前实现碳中和。为此，研发 CO_2 转化利用技术成为重要科技目标。

I. CH_4 还原 CO_2 是实现“双碳”经济的有效途径之一，相关的主要反应有：




(1) 反应 $\text{CH}_4(\text{g}) + 3\text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 4\text{CO}(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的 $\Delta H =$ _____ kJ/mol 。

(2) 恒压、 750°C 时， CH_4 和 CO_2 按物质的量之比1:3投料，反应经如下流程(主要产物已标出)可实现 CO_2 高效转化为 CO 。假设各步均转化完全，下列说法正确的是_____。(填字母序号)



- 过程 i 和过程 ii 中均未发生氧化还原反应
- 过程 ii 中使用的催化剂为 Fe 和 CaCO_3
- 过程 ii, CaO 吸收 CO_2 可促使 Fe_3O_4 氧化 CO 反应的平衡正向移动
- 相比于反应 A, 该流程的总反应还原 1 mol CO_2 需要吸收的能量更少

II. 用 CO_2 制备甲醇可实现 CO_2 的能源化利用，反应如下：



将反应气按进料比 $n(\text{CO}_2):n(\text{H}_2)=1:3$ 通入反应装置,选择合适的催化剂,发生反应。

(3) 不同温度和压强下, CH_3OH 平衡产率和 CO_2 平衡转化率分别如图 1、图 2 所示。




图1




图2

①图 1 中, 压强 p_1 p_2 (填“>”、“=”或“<”), 理由 。

②图 2 中, 压强为 p_2 , 温度高于 503 K 后, CO_2 平衡转化率随温度升高而增大的原因是 。

(4) 实际生产中, 测得压强为 p_3 时, 相同时间内不同温度下的 CH_3OH 产率如图 3 所示。

523 K 时, CH_3OH 产率最大, 可能的原因是 (填序号)。

- a. 此条件下主反应限度最大
- b. 此条件下主反应速率最快
- c. 523 K 时催化剂的活性最强





图3

III. 以 CO_2 为原料加氢还可以合成甲烷。

(5) 在 $T^\circ\text{C}$ 时, 将 CO_2 和 H_2 加入容积不变的密闭容器中, 发生反应: $\text{CO}_2(\text{g}) + 4\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 。能判断该反应达到平衡状态的是 。


- A. 容器内气体压强不再发生变化
- B. CO_2 的消耗速率和 CH_4 的生成速率相等
- C. 混合气体的密度不再发生变化
- D. 混合气体的平均相对分子质量不再发生变化

(6) CO_2 加氢制备 CH_4 的一种催化机理如图, 下列说法中正确的是 。



- A.催化过程使用的催化剂为 La_2O_3 和 $\text{La}_2\text{O}_2\text{CO}_3$
- B. $\text{La}_2\text{O}_2\text{CO}_3$ 可以释放出 CO_2^* (活化分子)
- C. H_2 经过Ni活性中心断键裂解产生活化态 H^* 的过程为放热过程
- D. CO_2 加氢制备 CH_4 的过程需要 La_2O_3 和Ni共同完成

24.(12分) 软锰矿浆(主要成分 MnO_2)可吸收烟气中的 SO_2 ，同时可制备 MnCO_3 ，工艺流程如下：




资料：①吸收 SO_2 后的软锰矿浆中含有 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 Al^{3+} 、 Zn^{2+} 等阳离子；
②金属离子沉淀的pH如下表。

金属离子	Mn^{2+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}	Al^{3+}	Zn^{2+}
开始沉淀的 pH	8.1	6.3	1.5	3.4	6.2
沉淀完全的 pH	10.1	8.3	2.8	4.7	8.2


- (1) 脱硫的产物是 MnSO_4 ，软锰矿中 MnO_2 所起的作用是_____。
- (2) 过程1向浆液中通入 O_2 的目的是_____。
- (3) 滤渣1的成分是_____，过程2中发生反应的离子方程式为_____。
- (4) 制备 MnCO_3 的过程中，一般控制溶液的pH范围为5~7，不宜过大或过小，原因是_____。
- (5) 已知：常温下， $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 溶液的pH约为9.3， NH_4HCO_3 溶液的pH约为7.8.请推测物质A，并写出制备 MnCO_3 时发生反应的离子方程式_____。
- (6) 取 $m\text{ g}$ 碳酸锰样品，加适量硫酸加热溶解后，用 $c\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 KMnO_4 溶液滴定，至滴定终点时，消耗 KMnO_4 溶液的体积为 $V\text{ mL}$ 。(已知：反应产物为 MnO_2 ，杂质不参与反应)，样品中 MnCO_3 质量分数的计算式为_____ (用质量分数表示)。

25.(11 分)为验证不同化合价铁的氧化还原能力，利用下列电池装置进行实验。



回答下列问题：

(1)由 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 固体配制 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{FeSO}_4$ 溶液，需要的仪器有药匙、玻璃棒、_____ (填序号)。



(2)电池装置中，盐桥连接两电极电解质溶液。盐桥中阴、阳离子不与溶液中的物质发生化学反应，并且电迁移率(u^∞)应尽可能地相近。根据下表数据，盐桥中应选择_____ (物质化学式)作为电解质。

阳离子	$u^\infty \times 10^8 / (\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{V}^{-1})$	阴离子	$u^\infty \times 10^8 / (\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{V}^{-1})$
Li^+	4.07	HCO_3^-	4.61
Na^+	5.19	NO_3^-	7.40
Ca^{2+}	6.59	Cl^-	7.91
K^+	7.62	SO_4^{2-}	8.27

(3)电流表显示电子由铁电极流向石墨电极。可知，盐桥中的阳离子进入_____电极溶液中。

(4)电池反应一段时间后，测得铁电极溶液中 $c(\text{Fe}^{2+})$ 增加了 $0.02 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。石墨电极上未见Fe析出。可知，石墨电极溶液中 $c(\text{Fe}^{2+}) =$ _____。

(5)根据(3)、(4)实验结果，可知石墨电极的电极反应式为_____，铁电极的电极反应式为_____。因此，验证了 Fe^{2+} 氧化性小于_____，还原性小于_____。

(6)实验前需要对铁电极表面活化。在 FeSO_4 溶液中加入几滴 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液，将铁电极浸泡一段时间，铁电极表面被刻蚀活化。检验活化反应完成的方法是_____。

26.(12 分)某小组以 FeCl_3 溶液为研究对象,探究物质之间反应的多样性,进行了如下实验。

I.探究 FeCl_3 溶液中的离子平衡和离子反应。

(1)配制50 mL $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 FeCl_3 溶液,测其pH约为0.7,即 $c(\text{H}^+) = 0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

①用化学用语解释 FeCl_3 溶液呈酸性的原因_____。

②下列实验方案中,能使 FeCl_3 溶液pH升高的是_____。

a.加水稀释 b.加入 FeCl_3 固体 c.滴加浓KSCN溶液 d.加入 NaHCO_3 固体

(2)小组同学利用上述 FeCl_3 溶液探究其与足量锌粉的反应。实验操作及现象如下:

操作	现象
向反应瓶中加入 6.5 g 锌粉, 然后加入 50 mL $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 FeCl_3 溶液, 搅拌	溶液温度迅速上升, 稍后出现红褐色沉淀, 同时出现少量气泡; 反应一段时间后静置, 上层溶液为浅绿色
收集检验反应过程中产生的气体	集气管口靠近火焰, 有爆鸣声

已知: Zn 的性质与 Al 相似, 能发生反应: $\text{Zn} + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{ZnO}_2 + \text{H}_2 \uparrow$ 。

①结合实验现象和平衡移动原理解释出现红褐色沉淀的原因_____。


②用离子方程式解释反应后溶液为浅绿色的原因_____。

(3)为进一步探究上述 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ FeCl_3 溶液中 Fe^{3+} 和 H^+ 氧化性的相对强弱,继续实验并观察到反应开始时现象如下:

操作	现象
将 5 mL $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 FeCl_3 溶液与 0.65 g 锌粉混合	溶液温度迅速上升, 开始时几乎没有气泡
将_____与 0.65 g 锌粉混合	溶液中立即产生大量气泡

小组同学得出结论: 在 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ FeCl_3 溶液中, Fe^{3+} 的氧化性比 H^+ 更强。

II.探究 FeCl_3 溶液与碱性物质之间的反应。



(4)②中逸出的无色气体是_____ (写化学式)。

(5)对于③中的实验现象，同学们有诸多猜测，继续进行实验：

i.甲组：取③中反应后溶液少许，滴入稀盐酸酸化，再滴加 BaCl_2 溶液，产生白色沉淀。得出结论： FeCl_3 与 Na_2SO_3 发生了氧化还原反应，离子方程式是_____。


ii.乙组：认为甲组的实验不严谨，重新设计并进行实验，证实了甲组的结论是正确的。其实实验方案是_____。

(6)受上述实验启发，小组同学对 $\text{pH} \approx 8$ 的 $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaF}$ 溶液与 FeCl_3 溶液混合时的现象产生了好奇并进行实验：

实验操作	④向 $2\text{mL } 0.2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{FeCl}_3$ 溶液中滴入 $2\text{mL } 1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaF}$ 溶液，
及现象	溶液变无色
	⑤向 $2\text{mL } 0.2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{FeCl}_3$ 溶液中滴入 2mL 蒸馏水，溶液颜色变浅

i.⑤的实验目的是_____。

ii.为探究④中溶液变无色的原因，进行了如下实验：



资料显示： FeF_3 溶液为无色。

请用化学平衡移动原理解释红褐色沉淀产生的原因_____。

(7) 根据以上实验， FeCl_3 溶液与碱性物质之间反应的多样性与_____有关。

参考答案:

1-21. DABCC DCAAD BCBAD BDCAD C

22.(10分) (1) ① $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$ ②b; c ③先减小后增大

(2) ①b ②2mol/L 盐酸溶液中 H^+ 浓度大于 2mol/L 醋酸溶液中 H^+ 浓度

(3) a (4) ① $c(\text{Na}^+) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$ ②C

23.(13分) (1) +329 (2) cd

(3) ① $>$, CO_2 制备 CH_3OH 的反应是气体体积减小的反应。当温度一定时, 增大压强, 该反应的平衡正向移动, CH_3OH 平衡产率增大, 故 $p_1 > p_2$ 。

②制备 CH_3OH 时, 同时发生主反应 $\text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 和副反应 $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 。主反应是气体分子数减小的放热反应, 升高温度, 平衡逆向移动, CO_2 转化率降低; 副反应为 $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \Delta H = +41 \text{ kJ/mol}$ 的正反应是吸热反应, 升高温度, 化学平衡正向移动, CO_2 的转化率增大(1分); 当温度高于 503 K 时, 以副反应为主(1分), 所以升高温度, CO_2 的平衡转化率增大

(4) bc (5) AD (6) BD

24.(12分) (1) 做氧化剂, 吸收烟气中的 SO_2 (2) 将 Fe^{2+} 氧化成 Fe^{3+}

(3) $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Al}(\text{OH})_3$ [或氢氧化铁与氢氧化铝] $\text{Zn}^{2+} + \text{S}^{2-} = \text{ZnS} \downarrow$

(4) pH 过小, Fe^{3+} 、 Al^{3+} 沉淀不完全; pH 过大, Mn^{2+} 转化成 $\text{Mn}(\text{OH})_2$ 沉淀。

(5) $\text{Mn}^{2+} + 2\text{HCO}_3^- = \text{MnCO}_3 \downarrow + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ (6) $\frac{34.5\text{cV}}{2\text{m}} \%$

25.(11分) (1) ABC (2) KCl (3) 石墨; (4) 0.09mol/L;

(5) $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$; $\text{Fe} - 2\text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$; Fe^{3+} ; Fe ;

(6) 取少量溶液, 滴入 KSCN 溶液, 不出现血红色。

26.(12分)

(1) ① $\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+$

②acd

(2) ①溶液温度升高, 反应过程中出现 H_2 使溶液中 $c(\text{H}^+)$ 降低, 都会促进 $\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+$ 正向移动, 出现红褐色 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀

② $2\text{Fe}^{3+} + \text{Zn} = 2\text{Fe}^{2+} + \text{Zn}^{2+}$

(3) 5 mL 0.2 mol $\cdot$ L $^{-1}$ (或 pH=0.7) 的盐酸(可不考虑 Cl^- 对反应的影响)

(4) CO_2

(5) i. $2\text{Fe}^{3+} + \text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} = 2\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{H}^+$

ii. 取③中反应后溶液少许, 滴加铁氰化钾溶液, 产生蓝色沉淀。

(6) i. 排除加水稀释对溶液颜色变化的影响

ii. 无色溶液中存在平衡: $\text{Fe}^{3+} + 3\text{F}^- \rightleftharpoons \text{FeF}_3$, 加入 NaOH 后, Fe^{3+} 更易与 OH^- 结合生成难溶的 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 。

(7) 离子的性质、碱性溶液的 pH。

北京高一高二高三期中试题下载

京考一点通团队整理了【**2023 年 10-11 月北京各区各年级期中试题 &答案汇总**】专题，及时更新最新试题及答案。

通过【**京考一点通**】公众号，对话框回复【**期中**】或者点击公众号底部栏目<**试题专区**>，进入各年级汇总专题，查看并下载电子版试题及答案！

