2024年普通高校考试招生制度改革适应性演练

化学试题

注意事项:

- 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在试卷、答题卡上。
- 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
- 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量: H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 Cl-35.5 Cu-64

一、选择题:本题共14小题,每小题3分,共42分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.下列广西优秀传统工艺品中,主要由合金材料制成的是

A. 壮乡铜鼓	B. 绣球	C. 坭兴陶	D. 壮锦

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】A

【解析】

【详解】A. 铜鼓为合金材料制成的, A 正确;

B. 绣球为绸布或花布制成, 不属于合金材料, B 错误;

C. 坭兴陶为硅酸盐材料制成, 不属于合金材料, C 错误;

D. 壮锦为棉线或丝线编织而成, 不属于合金材料, D 错误;

故选 A。

2. 黑火药的爆炸反应为 $S + 2KNO_3 + 3C = K_2S + N_2 \uparrow + 3CO_2 \uparrow$ 。与该反应有关的下列化学用语表述正确的是

A. 基态 S 的原子结构示意图为 $\textcircled{+16} \begin{matrix} \text{2} \\ \text{8} \\ \text{8} \end{matrix}$

B. K_2S 的电子式为 $K \times \overset{\cdot\cdot}{\underset{\cdot\cdot}{S}} \times K$

C. N_2 的结构式为 $N \equiv N$

D. CO_2 的空间构型为

【答案】C

【解析】

【详解】A. S 的原子序数为 16，原子核内有 16 个质子，核外有 16 个电子，基态 S 的原子结构示意图为：

B. K_2S 为离子化合物，电子式为： $K^+[:\ddot{S}:]^{2-}K^+$ ，B 项错误；

C. N_2 中两个氮原子形成氮氮三键，其结构式为 $N \equiv N$ ，C 项正确；

D. CO_2 的碳原子的价层电子对数为： $2 + \frac{1}{2}(4 - 2 \times 2) = 2 + 0 = 2$ ，根据价层电子对互斥理论，其空间构型为直线形，D 项错误；

故选 C。

3. 下列有关物质结构与性质的说法错误的是

A. I_2 易溶于 CCl_4 ，可从 I_2 和 CCl_4 都是非极性分子的角度解释

B. 对羟基苯甲酸存在分子内氢键，是其沸点比邻羟基苯甲酸的高的主要原因

C. $AgCl$ 溶于氨水，是由于 $AgCl$ 与 NH_3 反应生成了可溶性配合物 $[Ag(NH_3)_2]Cl$

D. 熔融 $NaCl$ 能导电，是由于熔融状态下产生了自由移动的 Na^+ 和 Cl^-

【答案】B

【解析】

【详解】A. 单质碘和四氯化碳都是非极性分子，根据相似相溶的原理， I_2 易溶于 CCl_4 ，A 正确；

B. 分子间氢键可以增大其熔沸点，则对羟基苯甲酸存在分子间氢键，是其沸点比邻羟基苯甲酸的高的主要原因，B 错误；

C. 银离子可以和氨气形成配合物离子，导致氯化银可以溶解在氨水中，C 正确；

D. 氯化钠在熔融状态产生了自由移动的 Na^+ 和 Cl^- ，从而可以导电，D 正确；

故选 B。

4. 实验室从药用植物里提取“生物碱浸膏”的下列操作中，工具或仪器选用错误的是

I. 切碎植物	II. 用乙醇浸出生物碱	III. 去除植物残	IV. 蒸馏浸出液得浸膏
---------	--------------	------------	--------------

	等	渣

A. 铡刀	B. 广口瓶	C. 分液漏斗	D. 蒸馏装置

A. A B. B C. C D. D

【答案】C

【解析】

【详解】A. 切碎植物时可使用铡刀，故 A 正确；

B. 植物碎片放入广口瓶中，加入乙醇浸出生物碱，故 B 正确；

C. 过滤去除植物残渣，应使用漏斗，故 C 错误；

D. 图 D 为蒸馏装置，可用于蒸馏浸出液得浸膏，故 D 正确；

故答案选 C。

5. 短周期元素 X、Y、Z、W 的原子序数依次增大。X 的原子核外有 1 个电子，Y 是地壳中含量最多的元素，Z 位于元素周期表第 IIIA 族，W 单质可广泛用于生产芯片。下列说法正确的是

A. 原子半径： $Y < Z < W$

B. 元素电负性： $X < Y < W$

C. W 的简单氢化物比 Y 的稳定

D. Z 单质制成的容器可盛放浓硫酸

【答案】D

【解析】

【分析】X 的原子核外有 1 个电子，X 为 H 元素，Y 是地壳中含量最多的元素，Y 为 O 元素，Z 位于元素周期表第 IIIA 族，Z 为 Al 元素，W 单质可广泛用于生产芯片，W 为 Si 元素，据此分析解题。

【详解】A. 同一周期从左到右原子半径逐渐减小，原子半径： $Al > Si > O$ ，故 A 错误；

B. 元素的非金属性越强，电负性越大，元素电负性： $H < Si < O$ ，故 B 错误；

C. 元素的非金属性越强，简单氢化物越稳定，稳定性： $H_2O > SiH_4$ ，故 C 错误；

D. 常温下浓硫酸可以使铝发生钝化，可用铝制容器盛放浓硫酸，故 D 正确；

故答案选 D。

6. 10-羟基喜树碱具有抗癌作用，其结构简式如图。下列有关该化合物的说法正确的是

- A. 有 2 种含氧官能团
 B. 可与 FeCl_3 溶液发生显色反应
 C. 可与 NaHCO_3 溶液反应产生 CO_2
 D. 有 2 个手性碳原子

【答案】B

【解析】

【详解】A. 10-羟基喜树碱中含有羟基，羰基和酯基三种氧官能团，故 A 错误；

B. 10-羟基喜树碱中含有酚羟基，可与 FeCl_3 溶液发生显色反应，故 B 正确；

C. 该分子中不含羧基，无法与 NaHCO_3 溶液反应产生，故 C 错误；

D. 该分子的手性碳如图所示，

，只有 1 个手性碳原子，故 D 错误；

故答案选 B。

7. 反应 $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{Cl}_2 = 2\text{Cl}^- + \text{O}_2 + 2\text{H}^+$ 常被用于除去水中残余氯。 N_A 为阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是

- A. 100mL $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ H_2O_2 溶液中含有的 H—O 键数目为 $0.2N_A$
 B. 25°C 、101kPa 时，22.4L Cl_2 中氯原子的数目为 $2N_A$
 C. 0.1mol O_2 含有质子的数目为 $0.8N_A$
 D. 通过上述反应除去 0.5mol Cl_2 ，电子转移的数目为 N_A

【答案】D

【解析】

【详解】A. 100mL $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ H_2O_2 溶液中的水中也含有 H—O 键，所以 H—O 键数目大于 $0.2N_A$ ，故 A 错误；

B. 25°C 、101kPa 不是标准状态，不适用用 22.4L/mol 计算，故 B 错误；

C. O 的质子数为 8, 0.1mol O_2 含有质子的数目为 $1.6N_A$, 故 C 错误;

D. 根据反应 $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{Cl}_2 = 2\text{Cl}^- + \text{O}_2 + 2\text{H}^+$, 转移电子数为 2, 所以除去 0.5mol Cl_2 , 电子转移的数目为 N_A , 故 D 正确;

故答案选 D。

8. 实验小组用过量 FeCl_3 溶液处理覆铜板得到浸出液, 并对其中的物质进行回收, 流程如下。下列有关说法正确的是

A. 浸出液呈中性

B. 滤渣只有铜粉

C. 用 KSCN 溶液检验是否“氧化”完全

D. 溶液 a 回收后可用于处理覆铜板

【答案】D

【解析】

【分析】从腐蚀废液（主要含 FeCl_3 、 FeCl_2 、 CuCl_2 ）中进行物质回收, 由流程可知, 先加入过量的 Fe , 与氯化铁、氯化铜反应生成氯化亚铁、铜, 滤渣中含 Fe 、 Cu , 加氯气氧化 FeCl_2 产生 FeCl_3 , 据此分析解题。

【详解】A. 腐蚀废液含有 Fe^{3+} , Cu^{2+} , Fe^{2+} , 水解使得溶液呈酸性, 故 A 错误;

B. 据分析可知, 滤渣中含 Fe 、 Cu , 故 B 错误;

C. 氯气氧化 FeCl_2 产生 FeCl_3 , 因为 FeCl_3 为产物, 只要反应开始就能使 KSCN 溶液变红, 无法检验是否“氧化”完全, 故 C 错误;

D. 溶液 a 为 FeCl_3 , 可用于处理覆铜板, 故 D 正确;

故答案选 D。

9. 为达到实验目的, 下列对应的实验方法正确或操作规范的是

选项	实验目的	实验方法或操作
A	配制 $250.00\text{mL } 0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaCl 溶液	称取 1.4625g NaCl 置于 250mL 容量瓶中, 加水至刻度线

B	除去粗盐溶液中的 Mg^{2+} 和 Ca^{2+}	向溶液中加入稍过量的 $NaOH$ 溶液，静置、过滤，向滤液中加入盐酸至弱酸性
C	探究 Cl 和 I 的非金属性强弱	向 $4mL 0.1mol \cdot L^{-1} KI$ 溶液中滴加 $1mL$ 新制的氯水，振荡，若溶液变成棕黄色，则 Cl 的非金属性强于 I
D	探究 $K_{sp}(PbSO_4)$ 和 $K_{sp}(PbS)$ 的大小	向 $1mL 0.01mol \cdot L^{-1} Pb(NO_3)_2$ 溶液中依次加入 5 滴 $0.01mol \cdot L^{-1} Na_2SO_4$ 溶液、 5 滴 $0.01mol \cdot L^{-1} Na_2S$ 溶液，若先观察到白色沉淀再观察到黑色沉淀，则 $K_{sp}(PbSO_4) > K_{sp}(PbS)$

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】D

【解析】

【详解】A. 配制 $250.00mL 0.1000mol \cdot L^{-1} NaCl$ 溶液时，称取的氯化钠固体应先在烧杯中溶解，再转移至容量瓶中定容，A 错误；

B. 向溶液中加入稍过量的 $NaOH$ 溶液，除去粗盐溶液中的 Mg^{2+} ，还需向溶液中加入碳酸钠溶液除去 Ca^{2+} ，过滤后再向滤液中加入适量盐酸除去过量的 $NaOH$ 、碳酸钠溶液，B 错误；

C. 新制氯水中的次氯酸、 Cl_2 ，均能将碘离子氧化为碘单质，故不能通过该实验探究 Cl 和 I 的非金属性强弱，而且应使用淀粉碘化钾变蓝色的现象，来说明是否生成碘单质，C 错误；

D. 向 $1mL 0.01mol \cdot L^{-1} Pb(NO_3)_2$ 溶液中依次加入 5 滴 $0.01mol \cdot L^{-1} Na_2SO_4$ 溶液、 5 滴 $0.01mol \cdot L^{-1} Na_2S$ 溶液，若先观察到白色沉淀硫酸铅，再观察到黑色沉淀 PbS ，则发生了沉淀转化，说明

$K_{sp}(PbSO_4) > K_{sp}(PbS)$ ，D 正确；

故选 D。

10. 利用下图的电化学装置，可实现

对 CO_2 的固定。下列说法错误的是

A. ClO_4^- 向 b 电极移动

B. a 电极的电极反应式为 $\text{F}_3\text{C}-\text{C}(\text{R}^1)=\text{C}(\text{R}^2)- + \text{CO}_2 + 2\text{e}^- = \text{F}_2\text{C}-\text{C}(\text{R}^1)=\text{C}(\text{R}^2)-\text{COO}^- + \text{F}^-$

C. 电解过程中有 H^+ 生成

D. b 电极的 Pt 用 Cu 代替后总反应不变

【答案】D

【解析】

【分析】如图可知，a 电极 $\text{F}_3\text{C}-\text{C}(\text{R}^1)=\text{C}(\text{R}^2)-$ 和 CO_2 得电子，发生还原反应为阴极，则 b 为阳极发生氧化反应，水放电生成 O_2 和 H^+ ，据此分析解题。

【详解】A. 电解池阳极吸引阴离子， ClO_4^- 向 b 电极移动，故 A 正确；

B. a 电极 $\text{F}_3\text{C}-\text{C}(\text{R}^1)=\text{C}(\text{R}^2)-$ 和 CO_2 得电子，电极反应式为 $\text{F}_3\text{C}-\text{C}(\text{R}^1)=\text{C}(\text{R}^2)- + \text{CO}_2 + 2\text{e}^- = \text{F}_2\text{C}-\text{C}(\text{R}^1)=\text{C}(\text{R}^2)-\text{COO}^- + \text{F}^-$ ，故

B 正确；

C. b 为阳极发生氧化反应，水放电生成 O_2 和 H^+ ，故 C 正确；

D. b 电极为阳极，Pt 用 Cu 代替后，Cu 放电生成 Cu^{2+} ，故 D 错误；

故答案选 D。

11. 下列表述对应的离子方程式书写正确的是

A. SO_2 与酸性 NaClO_3 溶液反应制备 ClO_2 ： $\text{SO}_2 + 2\text{ClO}_3^- = 2\text{ClO}_2 + \text{SO}_4^{2-}$

B. 碱性溶液中 ClO_2 与 Na_2O_2 反应制备 NaClO_2 ： $2\text{ClO}_2 + 2\text{Na}_2\text{O}_2 = 2\text{ClO}_2^- + \text{O}_2 + 2\text{Na}^+$

C. NaClO_2 在强酸溶液中生成 ClO_2 和 NaCl ： $4\text{H}^+ + 3\text{ClO}_2^- = 2\text{ClO}_2 \uparrow + \text{Cl}^- + 2\text{H}_2\text{O}$

D. 弱酸 HClO_2 在水中分解生成 O_2 : $\text{ClO}_2^- = \text{O}_2 \uparrow + \text{Cl}^-$

【答案】A

【解析】

【详解】A. SO_2 与酸性 NaClO_3 溶液反应制备 ClO_2 , 同时生成硫酸根离子, 其离子方程式为

B. 碱性溶液中 ClO_2 与 Na_2O_2 反应制备 NaClO_2 , 同时生成氧气, 其离子方程式为

C. NaClO_2 在强酸溶液中生成 ClO_2 和 NaCl , 其离子方程式为 $4\text{H}^+ + 5\text{ClO}_2^- = 4\text{ClO}_2 \uparrow + \text{Cl}^- + 2\text{H}_2\text{O}$, 故 C 错误;

D. 弱酸 HClO_2 在水中分解生成 O_2 , 同时生成氯离子, 弱酸不拆写, 其离子方程式为 $\text{HClO}_2 = \text{O}_2 \uparrow + \text{Cl}^- + \text{H}^+$, 故 D 错误;

故答案选 A。

12. 某镁镍合金储氢后所得晶体的立方晶胞如图 1(为便于观察, 省略了 2 个图 2 的结构), 晶胞边长为 $a\text{pm}$ 。

下列说法正确的是

A. 晶体的化学式为 Mg_2NiH_6

B. 晶胞中与 1 个 Mg 配位的 Ni 有 6 个

C. 晶胞中 2 个 Ni 之间的最近距离为 $a\text{pm}$

D. 镁镍合金中 Mg 、 Ni 通过离子键结合

【答案】A

【解析】

【详解】A. Ni 位于顶点和面心, 根据均摊法, Ni 的个数为 $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$, 每个 Ni 原子周围有 6 个 H , 因此 H 有 24 个, Mg 都在体内, 因此 Mg 有 8 个, 晶体的化学式为 Mg_2NiH_6 , A 正确;

B. 由图像可知, Mg 周围距离最近且相等的 Ni 有 4 个, 因此晶胞中与 1 个 Mg 配位的 Ni 有 4 个, B 错误;

C. 由图像可知，晶胞中最近的2个N位于面的中心和顶点上，距离为面对角线的一半，即 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ apm，C错误；

误；

D. Mg、Ni均为金属，合金中Mg、Ni通过金属键结合，D错误；

故选A。

13. 肼(N_2H_4)是一种含氢量高的燃料。向恒容密闭容器内加入 $3\text{mol } N_2H_4$ ，一定条件下体系中存在以下平衡：

不同温度下达到平衡时， N_2H_4 均几乎完全分解，分解产物的物质的量如图。下列说法正确的是

A. 曲线a对应的物质是 N_2

B. 低于M点对应温度时，以反应I为主

C. 体系中还可能存在 $2NH_3(g) \rightleftharpoons 3H_2(g) + N_2(g)$

D. N点时，体系内 $n(N_2):n(H_2)$ 为3:4

【答案】C

【解析】

【详解】A. 图中为分解产物的物质的量，当温度升高时， NH_3 趋于0，以反应I为主，根据反应 $N_2H_4(g) \rightleftharpoons N_2(g) + 2H_2(g)$ ，曲线a对应的物质是 H_2 ，故A错误；

B. 低于M点对应温度时， NH_3 含量高，以反应II为主，故B错误；

C. 由图可知，不同温度下达到平衡时， N_2H_4 均几乎完全分解，温度升高时， NH_3 趋于0，所以体系中还可能存在 $2NH_3(g) \rightleftharpoons 3H_2(g) + N_2(g)$ ，故C正确；

D. N 点时, $n(\text{N}_2)=n(\text{NH}_3)=2\text{mol}$, $n(\text{H}_2)=3\text{mol}$, 体系内 $n(\text{N}_2):n(\text{H}_2)$ 为 2: 3, 故 D 错误;

故答案选 C。

14. $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaOH}$ 溶液滴定 $20.00\text{mL } 0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_3\text{PO}_4$ 溶液时, $V(\text{NaOH})$ 、各含磷元素微粒的 $\lg\left[\frac{c}{(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})}\right]$ 和 pH 的关系如图。下列说法中正确的是

A. ①为 PO_4^{3-} 的 $\lg\left[\frac{c}{(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})}\right]$ 与 pH 的关系

B. b 点时, 溶液中 $c(\text{HPO}_4^{2-}) > c(\text{H}_3\text{PO}_4)$

C. H_3PO_4 的 $\frac{K_{a1}}{K_{a2}} = 10^{2.88}$

D. d 点时, 溶液中存在着 $c(\text{Na}^+) = c(\text{H}_2\text{PO}_4^-) + 2c(\text{HPO}_4^{2-}) + 3c(\text{PO}_4^{3-})$

【答案】B

【解析】

【分析】根据图中 a 点, $V(\text{NaOH})=10\text{ml}$ 时, 溶液中溶质为 $n(\text{H}_3\text{PO}_4):n(\text{NaH}_2\text{PO}_4)=1:1$, 故③④为磷酸和磷酸二氢钠的曲线, 又因为随着 pH 变大, H_3PO_4 浓度变小, 故③为 H_3PO_4 , ④为 H_2PO_4^- , 又因为 $\text{pH}=2.12$ 时, $c(\text{PO}_4^{3-})$ 最小, 故曲线②为 PO_4^{3-} , 曲线①为 HPO_4^{2-} , 据此分析回答;

【详解】A. 据分析可知①为 HPO_4^{2-} 的 $\lg\left[\frac{c}{(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})}\right]$ 与 pH 的关系, A 错误;

B. b 点时, $V(\text{NaOH})=20\text{ml}$, 此时溶质为 NaH_2PO_4 , 此时溶液 $\text{pH}=5$, 证明 H_2PO_4^- 电离程度大于水解程度, 故溶液中 $c(\text{HPO}_4^{2-}) > c(\text{H}_3\text{PO}_4)$, B 正确;

C. a 点, $V(\text{NaOH})=10\text{ml}$, 溶液中溶质为 $c(\text{H}_3\text{PO}_4):c(\text{NaH}_2\text{PO}_4)=1:1$, 即 $c(\text{H}_3\text{PO}_4)=c(\text{H}_2\text{PO}_4^-)$,

$K_{a1} = \frac{c(\text{H}_2\text{PO}_4^-) \times c(\text{H}^+)}{c(\text{H}_3\text{PO}_4)} = c(\text{H}^+) = 10^{-2.12}$; c 点, $V(\text{NaOH})=30\text{ml}$, $c(\text{H}_2\text{PO}_4^-):c(\text{HPO}_4^{2-})=1:1$, 即

$$c(\text{H}_2\text{PO}_4^-) = c(\text{HPO}_4^{2-}), K_{a2} = \frac{c(\text{HPO}_4^{2-}) \times c(\text{H}^+)}{c(\text{H}_2\text{PO}_4^-)} = c(\text{H}^+) = 10^{-7.20}, \frac{K_{a1}}{K_{a2}} = 10^{5.08}, \text{C 错误};$$

D. d 点时, 溶质为 Na_2HPO_4 , 溶液中存在电荷守恒

$$c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{H}_2\text{PO}_4^-) + 2c(\text{HPO}_4^{2-}) + 3c(\text{PO}_4^{3-}) + c(\text{OH}^-), \text{此时溶液 pH 为 10, 故}$$

$$c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+), \text{即 } c(\text{Na}^+) > c(\text{H}_2\text{PO}_4^-) + 2c(\text{HPO}_4^{2-}) + 3c(\text{PO}_4^{3-}), \text{D 错误};$$

故选 B。

二、非选择题: 本题共 4 小题, 共 58 分。

15. 层状结构 MoS_2 薄膜能用于制作电极材料。 MoS_2 薄膜由辉钼矿(主要含 MoS_2 及少量 FeO 、 SiO_2) 制得 MoO_3 后再与 S 经气相反应并沉积得到, 其流程如下。

回答下列问题:

- “焙烧”产生的 SO_2 用 NaOH 溶液吸收生成 NaHSO_3 的离子方程式为_____。
- “焙烧”后的固体用氨水“浸取”得到重钼酸铵 $[(\text{NH}_4)_2\text{Mo}_2\text{O}_7]$ 溶液, 为提高“浸取”速率, 可采用的措施是_____ (举一例)。
- “灼烧”过程中需回收利用的气体是_____ (填化学式)。
- 在 650°C 下“气相沉积”生成 MoS_2 的反应需在特定气流中进行, 选用 Ar 而不选用 H_2 形成该气流的原因是_____。
- 层状 MoS_2 晶体与石墨晶体结构类似, 层状 MoS_2 的晶体类型为_____。将 Li^+ 嵌入层状 MoS_2 充电后得到的 Li_xMoS_2 可作电池负极, 该负极放电时的电极反应式为_____。结合原子结构分析, Li^+ 能嵌入 MoS_2 层间可能的原因是_____。

【答案】15. $\text{SO}_2 + \text{OH}^- = \text{HSO}_3^-$

16. 将固体粉碎 17. NH_3

18. H_2 和 S 在加热条件下发生生成 H_2S

19. ①. 分子晶体 ②. $\text{Li}_x\text{MoS}_2 - x\text{e}^- = \text{MoS}_2 + x\text{Li}^+$ ③. Li^+ 为 Li 失去一个电子形成, 原子半径小

【解析】

【分析】 MoS_2 薄膜由辉钼矿(主要含 MoS_2 及少量 FeO 、 SiO_2)制得 MoO_3 后再与 S 经气相反应并沉积得到, 辉钼矿焙烧后使用氨水浸取得到 $[(\text{NH}_4)_2\text{Mo}_2\text{O}_7]$, 结晶后灼烧得到 MoO_3 , 最后与 S 经气相反应并沉积得到 MoS_2 , 据此分析解题。

【小问 1 详解】

SO_2 用 NaOH 溶液吸收, 生成 NaHSO_3 , 离子方程式为 $\text{SO}_2 + \text{OH}^- = \text{HSO}_3^-$, 故答案为

【小问 2 详解】

“焙烧”后的固体用氨水“浸取”得到重钼酸铵 $[(\text{NH}_4)_2\text{Mo}_2\text{O}_7]$ 溶液, 可将固体粉碎, 提高“浸取”速率, 故答案为将固体粉碎。

【小问 3 详解】

$[(\text{NH}_4)_2\text{Mo}_2\text{O}_7]$ 为铵盐, “灼烧”过程产生 NH_3 , 可回收利用, 故答案为 NH_3 。

【小问 4 详解】

H_2 和 S 在加热条件下发生生成 H_2S , 所以用 Ar 而不选用 H_2 , 故答案为 H_2 和 S 在加热条件下发生生成 H_2S 。

【小问 5 详解】

层状 MoS_2 晶体与石墨晶体结构类似, 所以层状 MoS_2 的晶体类型为分子晶体, 将 Li^+ 嵌入层状 MoS_2 充电后得到的 Li_xMoS_2 可作电池负极, 放电是原电池, 失去电子发生氧化反应, 电极反应式为

$\text{Li}_x\text{MoS}_2 - x\text{e}^- = \text{MoS}_2 + x\text{Li}^+$, Li^+ 为 Li 失去一个电子形成, 电子排布式为 $1s^2$, 原子半径小, 能嵌入 MoS_2

层间, 故答案为分子晶体; $\text{Li}_x\text{MoS}_2 - x\text{e}^- = \text{MoS}_2 + x\text{Li}^+$; Li^+ 为 Li 失去一个电子形成, 原子半径小。

16. 工业尾气脱硝是减少空气污染的重要举措。回答下列问题:

(1) 已知相关反应的热力学数据如下。

反应	$\frac{\Delta H}{\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}}$	$K_p(800\text{K})$
----	--	--------------------

$\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	-802.6	
$\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g})$	+182.6	
$\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{g}) + \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$		5.0×10^{62}
$2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$		$8.5 \times 10^{-3} (\text{kPa})^{-1}$

① CH_4 脱硝反应 $\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{g}) + \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的 $\Delta H =$ _____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。800K 时, 为了提高该反应中 NO 的平衡转化率, 理论上可采取的措施是 _____。

- A. 恒容时增大 O_2 的压强 B. 减小反应容器的容积
C. 移去部分 H_2O D. 选择合适的催化剂

② CH_4 另一脱硝反应 $\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{g}) + \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的 $K_p(800\text{K}) =$ _____ kPa 。

(2) 模拟工业尾气脱硝: 一定条件下, 将 $p(\text{CH}_4) : p(\text{NO}) : p(\text{O}_2) = 1 : 1 : 50$ 的气体与 Ar 混合, 匀速通过催化脱硝反应器, 测得 NO 去除率和 CH_4 转化率随反应温度的变化如图。

当温度低于 780K 时, NO 的去除率随温度升高而升高, 可能原因是 _____; 高于 780K 时, NO 的去除率随温度升高而降低, 结合(1)的信息分析其可能原因是 _____。

(3) 中国科学家利用 Cu 催化剂实现电化学脱硝。通过理论计算推测电解池阴极上 NO 可能的转化机理及转化步骤的活化能分别如下(*表示催化剂表面吸附位, 如 NOH^* 表示吸附于催化剂表面的 NOH)。

上述反应机理中，II~V 中速率最慢的步骤是_____。若电路中有 1mmol 电子流过，其中生成 NH_3 的选择性为 95%，电解池阴极生成的 NH_3 的物质的量为_____mmol。

【答案】(1) ①. -985.2 ②. AC ③. 5.9×10^4

(2) ①. 当温度低于 780K 时，反应未达到平衡，升高温度，向正反应方向移动，NO 的去除率升高。 ②. 高于 780K 时，反应放热，随温度升高平衡向逆向移动，NO 的去除率随温度升高而降低

(3) ①. II ②. 0.19

【解析】

【分析】把方程式分别编号如下：

【小问 1 详解】

①：根据盖斯定律，①-②=③， $\Delta H_3 = \Delta H_1 - \Delta H_2 = (-802.6 - 182.6) \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = -985.2 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ；

800K 时，为了提高该反应中 NO 的平衡转化率，

A. 恒容时增大 O_2 的压强，增加氧气，平衡右移，NO 的平衡转化率增大，A 正确；

B. 减小反应容器的容积，相当于增大压强，前后系数相等，平衡不移，B 错误；

C. 移去部分 H_2O ，平衡右移，NO 的平衡转化率增大，C 正确；

D. 选择合适的催化剂，平衡不移，D 错误；

故选 AC。

②: 根据盖斯定律, ③-④=⑤, 故 $K_p(800\text{K}) = \frac{K_p(3)}{K_p(4)} = \frac{5.0 \times 10^{62}}{8.5 \times 10^{-3}} = 5.9 \times 10^{64}$ 。

【小问 2 详解】

①当温度低于 780K 时, 反应未达到平衡, 升高温度, 向正反应方向移动, NO 的去除率升高;

②高于 780K 时, 反应放热, 随温度升高平衡向逆向移动, NO 的去除率随温度升高而降低。

【小问 3 详解】

①活化能越大速率越慢, II ~ V 中速率最慢的步骤是 II;

②由 NO 的转化机理可知方程式为: $\text{NO} + 5\text{H}^+ + 5\text{e}^- = \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$, 生成 1mol NH_3 转移 5mol 电子, 若电路中有 1mmol 电子流过, 其中生成 NH_3 的选择性为 95%, 电解池阴极生成的 NH_3 的物质的量为

$$\frac{1}{5} \times 0.95 = 0.19 \text{mmol}。$$

17. 铜(I)配合物 $[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4]\text{ClO}_4$ 的制备及纯度分析步骤如下。

I. 制备 $[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4]\text{ClO}_4$

将乙腈 (H_3CN)、 $\text{Cu}(\text{ClO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 、过量铜粉混合于圆底烧瓶, 控温 85°C 、磁力搅拌, 至反应完全(装置如图)。经一系列操作, 得到白色固体产品。

II. 纯度分析

取 mg 产品完全溶解于足量浓硝酸中, 再加水、醋酸钠溶液配成 250.0mL 溶液。取 25.0mL 溶液, 加入指示剂后, 再用 $\text{cmol} \cdot \text{L}^{-1}$ EDTA 标准溶液滴定至终点。平行滴定三次, 消耗 EDTA 溶液的平均体积为 VmL。

已知: ① CH_3CN 沸点为 81°C , 酸性条件下遇水生成 $\text{CH}_3\text{COONH}_4$;

② $[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4]\text{ClO}_4$ ($M = 327.5\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$) 较易被空气氧化;

③ EDTA 与 Cu^{2+} 形成 1: 1 配合物;

滤液、蒸发浓缩、冷却结晶得到晶体、过滤、洗涤、干燥；

【小问 4 详解】

已知：① CH_3CN 酸性条件下遇水生成 $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ ；② $[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4]\text{ClO}_4$ 较易被空气氧化；则 $[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4]^+$ 与足量浓硝酸发生反应，生成弱酸醋酸、铵根离子，一价铜被硝酸氧化为二价铜，同时硝酸被还原生成二氧化氮气体，离子方程式为 $[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4]^+ + 6\text{H}^+ + \text{NO}_3^- + 7\text{H}_2\text{O} = \text{Cu}^{2+} + \text{NO}_2 \uparrow + 4\text{CH}_3\text{COOH} + 4\text{NH}_4^+$ ；

【小问 5 详解】

醋酸钠溶液水解显碱性，已知：滴定需在弱碱性条件下进行，故加入醋酸钠溶液的主要目的是为滴定提供碱性环境；

【小问 6 详解】

EDTA 与 Cu^{2+} 形成 1: 1 配合物，则 25.0mL 溶液中

$n([\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4]\text{ClO}_4) = n(\text{EDTA}) = c \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times V \times 10^{-3} \text{ L} = cV \times 10^{-3} \text{ mol}$ ，故产品的纯度为

$$\frac{cV \times 10^{-3} \text{ mol} \times \frac{250}{25} \times 327.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{m} \times 100\% = \frac{327.5cV}{m} \%$$

【小问 7 详解】

- A. 产品中含有 $\text{Cu}(\text{ClO}_4)_2$ ，使得标准液用量偏大，导致测定结果偏高，A 正确；
 B. 滴定终点时俯视读数，使得标准液读数偏小，测定结果偏低，B 错误；
 C. 盛装 EDTA 溶液的滴定管未润洗 使得标准液用量偏大，导致测定结果偏高，C 正确；
 D. 产品干燥不充分，使得样品 m 偏大，导致测定结果偏低，D 错误；
 故选 AC。

18. 英菲替尼(化合物 L)是治疗胆管癌的新型药物，其合成路线如下。

回答下列问题：

(1) A 的化学名称是_____。

(2) 由 A 生成 C 的反应类型是_____。

(3) E 的结构简式为_____。

(4) 由 G→J 的转化过程可知, G 转化为 H 的目的是_____。

(5) 符合下列条件的 B 的同分异构体共有_____种, 其中一种的结构简式为_____。

①分子中含环状结构 ②核磁共振氢谱显示 2 组峰

(6) L 中氮原子的杂化方式为_____。

(7) 1, 3-二苯基脲( )是某些药物分子的重要结构单元。参照上述合成路线, 写出以苯为原料制备 1, 3-二苯基脲的合成路线(无机试剂任选)。

【答案】 18. 4-溴硝基苯或对溴硝基苯

19. 取代反应

20.

21. 保护氨基

22.

①. 3

23. sp^2 、 sp^3

24.

【解析】

【分析】 由框图可知, A ( ) 与 B ( ) 发生取代反应生成 C ( ) 和 HBr, C 与 H_2 发生还原反应, $-NO_2$ 还原为 $-NH_2$, 生成 D ( ) , D 与 E ( )

发生取代反应生成 F ( ) 和 HCl, G ( ) 与 反

应生成 H ( ), 保护-NH₂, H 与 SOCl₂ 发生取代反应生成 I ( ), I 与 KOH 反

应生成 J ( ), 将-NH₂ 恢复, J 与 COCl₂ 反应生成 K ( ), K 与 F 发生取

代反应生成目标产物英菲替尼 L ( )。

【小问 1 详解】

A 为 , 名称为 4-溴硝基苯或对溴硝基苯;

【小问 2 详解】

根据分析, 由 A 生成 C 的反应类型是取代反应;

【小问 3 详解】

根据分析, E 的结构简式为 ;

【小问 4 详解】

根据分析，G 转化为 H 的目的是保护氨基；

【小问 5 详解】

B 为 ，分子式为 $C_6H_{14}N_2$ ，①分子中含环状结构，②核磁共振氢谱显示 2 组峰说明分子结构

对称性较好，符合条件的同分异构体有 、 、 ，共 3 种；

【小问 6 详解】

L 中以单键相连的 N 为 sp^3 杂化，有双键相连的 N 为 sp^2 杂化；

【小问 7 详解】

要合成 ，需要用 和 反应合成， 由

还原得到， 由 与 $COCl_2$ 反应得到，因此合成路线为