

高二年级化学试题 2023.11.23

本试卷分第I卷（选择题）和第II卷（非选择题）两部分，满分 100 分，考试时间 90 分钟。所有答案必须填涂或作答在答题卡上，否则不得分。

可能用到的相对原子质量：H 1 O 16 C 12 N 14 Na 23 S 32 Cl 35.5 Fe 56 Zn 65

第I卷（选择题 共 42 分）

本卷共 21 小题，每小题 2 分。在每小题列出的四个选项中，选出最符合题目答案的一项。


1. 下列设备工作时，将化学能转化为热能的是

- A. 硅太阳能电池 B. 铅蓄电池 C. 燃气灶 D. 电烤箱

2. 下列操作中，能使电离平衡 $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$ ，逆向移动的是

- ~~A~~ 向水中加入少量氯化铵固体 B. 向水中通入少量氯化氢气体
~~C~~ 向水中加入少量氯化钠固体 D. 将水加热到 100°C ，使 $\text{pH}=6$

3. 下列对于四个实验的说法中，正确的是



- A. 实验②③④中 Cl^- 均向阳极移动
B. 实验①④中铜电极上均发生还原反应
C. 反应进行过程中，②④中阴极附近溶液的 pH 均明显减小
D. ②③中的碳棒均换为铁棒，电极反应均不发生改变

4. 痛风病与关节滑液中形成的尿酸钠 (NaUr) 有关， NaUr 增多，病情会加重。体内产生尿酸钠的化学原理为： $\text{HUr}(\text{aq}) + \text{Na}^+(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{NaUr}(\text{s}) + \text{H}^+(\text{aq})$ $\Delta H < 0$

下列说法不正确的是


- ~~A~~ 寒冷季节更易诱发关节疼痛
B. 大量饮水会增大痛风病发作的可能性
~~C~~ 饮食中摄入过多食盐，会加重痛风病病情
D. 患痛风病的人应少吃能代谢产生更多尿酸的食物

5. 下列有关水处理方法不正确的是

- A. 用可溶性的铝盐和铁盐处理水中的悬浮物
B. 用氯气处理水中的 Cu^{2+} 、 Hg^{2+} 等重金属离子
C. 用石灰、碳酸钠等碱性物质处理废水中的酸
D. 向水中通入 O_3 ，用以杀菌消毒


6. 三氯氢硅 (SiHCl_3) 是制备硅烷、多晶硅的重要原料, 在催化剂作用下可发生反应:
 $2\text{SiHCl}_3(\text{g}) \rightleftharpoons \text{SiH}_2\text{Cl}_2(\text{g}) + \text{SiCl}_4(\text{g})$, 在 50°C 和 70°C 时 SiHCl_3 的转化率随时间变化的结果如图示。下列叙述不正确的是

- A. 该反应中反应物的总能量比生成物的总能量低
 B. 反应速率大小: $v_a > v_b$
 C. 反应中加入的催化剂不仅可以改变反应路径, 还可以改变其焓变
 D. 增大压强, 不能提高 SiHCl_3 的平衡转化率, 但能缩短达平衡的时间



7. 液体锌电池是一种电压较高的二次电池, 具有成本低、安全性强、可循环使用等特点, 其示意图如图。下列说法不正确的是

已知: ① $\text{Zn}(\text{OH})_2 + 2\text{OH}^- = \text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$, ② KOH 凝胶中允许离子存在、生成或迁移。





- A. 放电过程中, H^+ 由负极向正极迁移
 B. 放电过程中, 负极的电极反应: $\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$
 C. 充电过程中, 阴极的电极反应: $\text{Zn}(\text{OH})_4^{2-} + 2\text{e}^- = \text{Zn} + 4\text{OH}^-$
 D. 充电过程中, 凝胶中的 KOH 可再生

8. 将 1mol N_2 和 3mol H_2 充入某固定体积的密闭容器中, 在一定条件下, 发生反应
 $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g}) \Delta H < 0$ 并达到平衡, 改变条件, 下列关于平衡移动说法中正确的是

选项	改变条件	平衡移动方向
A	使用适当催化剂	平衡向正反应方向移动
B	升高温度	平衡向逆反应方向移动
C	再向容器中充入 1mol N_2 和 3mol H_2	平衡不移动
D	向容器中充入氦气	平衡向正反应方向移动

9. 下列实验中, 对现象的解释不正确的是

选项	A	B	C	
装置及操作	 装有NO_2的密闭注射器 向右轻轻推动 活塞压缩体积	 3滴$1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ KSCN溶液 1mL $0.01\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ FeCl_3溶液 + 1mL $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ KSCN溶液	 接电导率仪 蒸馏水 分别测定 20°C 和 80°C 蒸馏水的电导率	 接电导率仪 1g CaCO_3 粉末 蒸馏水
现象	气体红棕色先变深再变浅	溶液血红色加深	80°C 蒸馏水的电导率大于 20°C 的	加入 CaCO_3 粉末后电导率增大
解释	压强增大， $2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$ 平衡先逆向移动，再正向移动	增大反应物浓度， $\text{Fe}^{3+} + 3\text{SCN}^- \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{SCN})_3$ 平衡正向移动	温度升高，水的电离平衡正向移动	CaCO_3 在水中存在 $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{aq})$

10. 下列过程或现象与盐类水解无关的是

- A. 配制硫酸铁溶液时加入硫酸
- B. 氯化铵、氯化锌溶液作除锈剂
- C. 加热氯化铁溶液颜色变深
- D. 钢铁在潮湿的环境下生锈


11. 常温下, 下列关于电解质溶液的判断正确的是

- A. 在 $\text{pH}=12$ 的溶液中, K^+ 、 Cl^- 、 HCO_3^- 、 Na^+ 可以大量共存
- B. 在 $\text{pH}=0$ 的溶液中, Na^+ 、 NO_3^- 、 SO_3^{2-} 、 K^+ 可以大量共存
- C. 由 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 一元酸 HA 溶液的 $\text{pH}=3$, 可推知 NaA 溶液中存在 $\text{A}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HA} + \text{OH}^-$
- D. 由 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 一元碱 BOH 溶液的 $\text{pH}=10$, 可推知 BOH 在溶液中的电离是 $\text{BOH} = \text{B}^+ + \text{OH}^-$

12. 常温下, 某溶液由 $a \text{ mol/L CH}_3\text{COONa}$ 和 $b \text{ mol/L CH}_3\text{COOH}$ 组成的混合液, 下列说法中正确的是

- A. 该溶液一定呈酸性
- B. 该溶液一定呈碱性
- C. 该溶液一定呈中性
- D. CH_3COONa 会抑制 CH_3COOH 的电离

13. 十九大报告中提出要“打赢蓝天保卫战”, 意味着对污染防治比过去要求更高。工业上用 Na_2SO_3 溶液吸收硫酸工业尾气中的 SO_2 , 并通过电解方法实现吸收液的循环再生。其中阴、阳离子交换膜组合循环再生机理如图所示, 下列有关说法正确的是



- A. X 应为直流电源的正极
- B. 电解过程中阴极区 pH 升高
- C. 图中的 $b\% < a\%$
- D. SO_3^{2-} 在电极上发生的反应为: $\text{SO}_3^{2-} + 2\text{OH}^- - 2\text{e}^- = \text{SO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O}$


14. 已知: $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g}) \quad \Delta H > 0$, 现将 $1 \text{ mol N}_2\text{O}_4$ 充入 2 L 密闭容器中, 下列说法中不能说明反应达到平衡状态的是

- A. N_2O_4 质量不再变化
- B. 混合气体的总质量不再变化
- C. 气体颜色不再发生变化
- D. NO_2 的消耗速率是 N_2O_4 消耗速率的 2 倍

15. 下列实验事实不能证明醋酸是弱电解质的是

- A. 相同 pH 的醋酸溶液和盐酸分别与同样颗粒大小的锌反应时, 产生 H_2 的起始速率相等
- B. 相同 pH 、相同体积的盐酸和醋酸溶液中和同浓度 NaOH 溶液的能力: 醋酸 $>$ 盐酸
- C. 常温下, 将 $\text{pH}=1$ 的醋酸溶液稀释 1000 倍, 测得 $\text{pH} < 4$
- D. 常温下, 醋酸溶液的导电性比同物质的量浓度盐酸的弱

16. 一定量的 CO_2 与足量的碳在体积可变的恒压密闭容器中发生反应： $\text{C(s)} + \text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{CO(g)}$ 平衡时，体系中气体体积分数与温度的关系如下图所示。下列推断正确的是




- A. 正反应为放热反应
B. 550 °C 时，若充入惰性气体，平衡不移动
C. 650 °C 时， CO_2 的平衡转化率为 25%
D. T °C 时，若再充入等物质的量的 CO_2 和 CO ，平衡逆向移动

17. 常温下，pH=2 的氯化铁溶液，pH=2 的硫酸溶液，pH=12 的氨水溶液，pH=12 的碳酸钠溶液，水的电离程度分别为 a、b、c、d。上述四种溶液水的电离程度大小比较，正确的是


- A. $a=d>b=c$ B. $a=d>c>b$ C. $b=c>a=d$ D. $b=c>a>d$

18. 已知： $\text{Ag}^+ + \text{SCN}^- = \text{AgSCN} \downarrow$ (白色)，某同学探究 AgSCN 的溶解平衡及转化，进行以下实验。下列说法中，不正确的是



- A. ①中现象能说明 Ag^+ 与 SCN^- 生成 AgSCN 沉淀的反应有限度
B. ②中现象产生的原因是发生了反应 $\text{Fe(SCN)}_3 + 3\text{Ag}^+ = 3\text{AgSCN} \downarrow + \text{Fe}^{3+}$
C. ③中产生黄色沉淀的现象能证明 AgI 的溶解度比 AgSCN 的溶解度小
D. ④中黄色沉淀溶解的原因可能是 AgI 与 KI 溶液中的 I^- 进一步发生了反应

19. 向 AgNO_3 溶液中通入过量 SO_2 ，过程和现象如图。



经检验，白色沉淀为 Ag_2SO_3 ；
灰色固体中含有 Ag 。

下列说法不正确的是

- A. ①中生成白色沉淀的离子方程式为 $2\text{Ag}^+ + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{Ag}_2\text{SO}_3 \downarrow + 2\text{H}^+$
B. ①中未生成 Ag_2SO_4 ，证明溶度积： $K_{\text{sp}}(\text{Ag}_2\text{SO}_3) < K_{\text{sp}}(\text{Ag}_2\text{SO}_4)$
C. ②中的现象体现了 Ag^+ 的氧化性
D. 该实验条件下， SO_2 与 AgNO_3 反应生成 Ag_2SO_3 的速率大于生成 Ag 的速率

20. 中国研究人员研制出一种新型复合光催化剂, 利用太阳光在催化剂表面实现高效分解水, 其主要过程如下图所示。




已知: 几种物质中化学键的键能如下表所示。

化学键	H ₂ O 中的 H—O 键	O ₂ 中的 O=O 键	H ₂ 中的 H—H 键	H ₂ O ₂ 中的 O—O 键	H ₂ O ₂ 中的 O—H 键
键能 kJ/mol	463	496	436	138	463


若反应过程中分解了 2 mol 水, 则下列说法不正确的是

- A. 总反应为 $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{光照}} 2\text{H}_2\uparrow + \text{O}_2\uparrow$ B. 过程 I 吸收了 926 kJ 能量
C. 过程 II 放出了 574 kJ 能量 D. 过程 III 属于放热过程

21. $\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{s})$ 与 $\text{CO}(\text{g})$ 主要发生如下反应。



反应的还原产物与温度密切相关。其他条件一定, $\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{s})$ 和 $\text{CO}(\text{g})$ 反应达平衡时, $\text{CO}(\text{g})$ 的体积分数随温度的变化关系如图所示。下列说法不正确的是



- A. 反应 $\text{FeO}(\text{s}) + \text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ 的焓变为 $(\Delta H_2 - \Delta H_1)/3$
B. 根据图象推测, ΔH_2 应当小于 0
C. 反应温度越高, $\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{s})$ 主要还原产物中铁元素的价态越低
D. 温度高于 1040°C 时, $\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{s})$ 和 $\text{CO}(\text{g})$ 发生的主要反应的化学平衡常数 $K > 4$

第 II 卷 (非选择题 共 58 分)

22. (11 分) (一) 已知某 NaOH 试样中含有 NaCl 杂质, 为测定试样中 NaOH 的质量分数, 进行如下步骤实验:

- 称量 1.0 g 样品溶于水, 配成 250 mL 溶液;
- 准确量取 25.00 mL 所配溶液于锥形瓶中;
- 滴加几滴酚酞溶液;
- 用 0.1000 mol/L 的标准盐酸滴定三次, 每次消耗盐酸的体积记录如下:

滴定序号	待测液体积 (mL)	所消耗盐酸标准液的体积(mL)	
		滴定前	滴定后
1	25.00	0.50	20.60
2	25.00	6.00	26.00
3	25.00	1.10	21.00

请回答：

- (1) 将样品配成250mL 溶液, 除小烧杯、玻璃棒、胶头滴管外, 还需用到的玻璃仪器有_____。
- (2) 用_____滴定管(填“酸式”或“碱式”)盛装0.1000 mol/L 的盐酸标准液。
- (3) 烧碱样品的纯度(即 NaOH 的质量分数)为_____。
- (4) 若出现下列情况, 测定结果偏高的是_____。
 - a. 滴定前用蒸馏水冲洗锥形瓶
 - b. 在振荡锥形瓶时不慎将瓶内溶液溅出
 - c. 若在滴定过程中不慎将数滴酸液滴在锥形瓶外
 - d. 盛装标准液的滴定管水洗后未用标准液再润洗

(二) 常温下, 用 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 溶液分别滴定 $25.00 \text{ mL } 0.1000 \text{ mol/L HCl}$ 溶液和 $25.00 \text{ mL } 0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CH}_3\text{COOH}$ 溶液, 得到 2 条滴定曲线, 如下图所示。




图 1






图 2

- (5) E 点的溶液中电荷守恒关系式是 $c(\text{Na}^+) + \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}}$ 。
- (6) $c(\text{Na}^+) = c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 的点是_____。
- (7) 在上面用 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 溶液滴定 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CH}_3\text{COOH}$ 溶液的图中, 下列 4 种离子的物质的量浓度排序有可能出现的是_____。
 - a. $c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{H}^+) > c(\text{Na}^+) > c(\text{OH}^-)$
 - b. $c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-) > c(\text{Na}^+) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$
 - c. $c(\text{Na}^+) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-) = c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$
 - d. $c(\text{Na}^+) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$

23. (15分) (一) 锌铜原电池装置如右图所示, 下列说法正确的是

- (1) 铜电极上发生____ (填“氧化”或“还原”) 反应
- (2) 导线中, ____ (填“电流”或“电子”) 从锌片流向铜片
- (3) 盐桥中 K^+ 向____ (填“负极”或“正极”) 移动
- (4) 锌电极上发生的电极反应式为_____



- (5) 根据原电池原理制造出了多种化学电源。如图是甲醇燃料电池原理示意图, 该电池正极的电极反应式为_____。

(二) 碳酸钠在生产和生活中都有非常重要的用途。

(6) 碳酸钠俗名纯碱, 常温下, 0.1mol/L 碳酸钠溶液 pH 为 11。

- ① 该溶液中由水电离出的 $c(\text{OH}^-)_\text{水}$ 为_____ mol/L 。
- ② 某同学认为该溶液中粒子之间有如下关系, 你认为其中正确的是____ (填字母)。
 - a. $2c(\text{Na}^+) = c(\text{CO}_3^{2-})$
 - b. $c(\text{Na}^+) < 2c(\text{CO}_3^{2-})$
 - c. $c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{HCO}_3^-) < 0.1\text{mol/L}$
 - d. $c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{OH}^-) + c(\text{CO}_3^{2-}) = c(\text{H}^+) + c(\text{Na}^+)$
- ③ 在两支试管中均加入该碳酸钠溶液 2mL , 分别滴加浓度均为 $0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的硫酸和醋酸溶液, 至气泡不再产生时所用两种酸的体积依次是 $V_1\text{L}$ 、 $V_2\text{L}$ 。则 V_1 、 V_2 的关系为 $V_1 = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

(7) 已知氢氧化钠能促进油脂水解。而在日常生活中, 油污常用热的碳酸钠溶液清洗, 请结合碳酸钠水解的离子方程式和必要的文字解释原因_____。

(8) 锅炉水垢的主要成分是碳酸钙和硫酸钙, 清洗时, 经常先加入饱和的碳酸钠溶液浸泡, 最后用酸溶解。结合沉淀溶解平衡原理解释清洗硫酸钙的过程_____。

(9) 当器壁上附有 BaSO_4 很难除去时, 也常采用沉淀转化的方法。已知某温度下 $K_{\text{sp}}(\text{BaCO}_3) = 5.1 \times 10^{-9}$, $K_{\text{sp}}(\text{BaSO}_4) = 1.0 \times 10^{-10}$ 。在该温度下要使 BaSO_4 转化成 BaCO_3 , Na_2CO_3 溶液的浓度应大于_____ mol/L 。



(10) 已知 HClO 和 H_2CO_3 电离平衡常数:

HClO	$K = 3 \times 10^{-8}$	
H_2CO_3	$K_1 = 4 \times 10^{-7}$	$K_2 = 6 \times 10^{-11}$

则向 Na_2CO_3 溶液中滴加过量的氯水, 有关反应的离子方程式为: _____

(11) 用 $150\text{mL } 1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的氢氧化钠溶液吸收标准状况下的 2.24L 二氧化碳, 所得溶液中各离子的浓度由大到小的顺序为 _____。


24. (9分) CO_2 资源化利用对缓解碳减排压力具有重要意义,使用镍氢催化剂可使 CO_2 转化为 CH_4 。反应体系中主要反应的热化学方程式为:





(1) 将反应后气体通入_____ (填试剂), 可证明反应 II 发生。

(2) 计算 $2\text{CH}_4(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \quad \Delta H =$ _____ (用 ΔH_1 和 ΔH_2 表示)


(3) 相同投料比时, 体系内 CO_2 的平衡转化率与温度 T 和压强 p 的关系如右图, 温度从高到低的顺序为_____。




(4) 镍氢催化剂活性会因为甲烷分解产生积碳而降低, 同时二氧化碳可与碳发生消碳反应:



其他条件相同时, 催化剂表面积碳量与温度的关系如右图所示, $T_0^\circ\text{C}$ 之后, 温度升高积碳量减小的主要原因是_____。




(5) 向 1 L 恒容、密闭容器中通入 1 mol CO_2 和 4 mol H_2 , 测得有关物质的物质的量随温度变化如下图。



① 催化剂在较低温度时主要选择_____ (填“反应 I”或“反应 II”)

② T_1 时 CO_2 的转化率为_____, 反应 I 的平衡常数 $K =$ _____。

25. (11分) 红矾钠 ($\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 可用于制备制革产业中的铬鞣剂。对含铬污泥进行酸浸处理后, 得到浸出液(主要含 Na^+ 、 Ni^{2+} 、 Cr^{3+} 、 H^+ 、 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 和 SO_4^{2-}), 经过如下主要流程, 可制得红矾钠, 实现铬资源的有效循环利用。



已知: i. Cr(VI) 溶液中存在以下平衡: $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}^+$

ii. 相关金属离子形成氢氧化物沉淀的 pH 范围如下:

金属离子	开始沉淀的 pH	沉淀完全的 pH
Cr^{3+}	4.3	5.6
Ni^{2+}	7.1	9.2

注: 金属离子的起始浓度为 0.1 mol/L 。

(1) I 中, NaHSO_3 溶液呈酸性, 结合化学用语说明其原因: _____。

(2) II 中, 加入 NaOH 调节 pH 至 _____ (填字母序号)。

a. 4.3~5.6 b. 4.3~7.1 c. 5.6~7.1 d. 7.1~9.2

(3) III 中, H_2O_2 氧化 Cr(OH)_3 沉淀的化学方程式为 _____。

(4) III 中, 在投料比、反应时间均相同时, 若温度过高, Na_2CrO_4 的产率反而降低, 可能的原因是 _____。

(5) IV 中, 加入 H_2SO_4 的作用是 _____ (结合平衡移动原理解释)。

(6) 为了测定获得红矾钠 ($\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 的纯度, 称取上述流程中的产品 $a \text{ g}$ 配成 100 mL 溶液, 取出 25 mL 放于锥形瓶中, 加入稀硫酸和足量的 KI 溶液, 置于暗处充分反应至 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 全部转化为 Cr^{3+} 后, 滴入 2~3 滴淀粉溶液, 最后用浓度为 $c_1 \text{ mol/L}$ 的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定, 共消耗 $V_1 \text{ mL}$ 。(已知: $\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} = 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$, 且溶液中 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 和 $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ 均为无色离子。)

① 滴定终点的现象为 _____。

② 所得 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (摩尔质量为 298 g/mol) 的纯度的表达式为 _____ (用质量分数表示)。

26. (12分) 实验小组同学探究稀 H_2SO_4 对溶液中的 I^- 被 O_2 氧化的影响因素。

(1) 为了探究 $c(\text{H}^+)$ 对反应速率的影响, 进行实验:

加入试剂  10mL $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ KI 溶液 5 滴淀粉溶液	序号	加入试剂	变色时间
	I	10 mL 蒸馏水	长时间放置, 未见明显变化
	II	10mL $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液	放置 3min 后, 溶液变蓝
	III	10mL $0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液	放置 1min 后, 溶液变蓝
	IV	10mL $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{K}_2\text{SO}_4$ 溶液	长时间放置, 未见明显变化

① 写出实验II发生反应的离子方程式 _____。

② 实验I~IV 所得结论: _____。

③ 增大实验II反应速率还可以采取的措施 _____。

④ 实验IV的作用是_____。


(2) 为探究 $c(\text{H}^+)$ 除了对反应速率影响外, 是否还有其他影响, 提出假设:

i. 增大 $c(\text{H}^+)$, 增强 O_2 的氧化性;

ii. 增大 $c(\text{H}^+)$, _____。

小组同学利用下图装置设计实验方案, 对假设进行验证。

可供选择的试剂有: 蒸馏水、 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ KI 溶液、 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{K}_2\text{SO}_4$ 溶液、 $0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液。

	序号	溶液 a	溶液 b	现象
	V	10 mL $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ KI 溶液 10 mL H_2O	10 mL $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{K}_2\text{SO}_4$ 溶液 10 mL H_2O	指针未见偏转
	VI	10 mL $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ KI 溶液 10 mL H_2O	10 mL $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{K}_2\text{SO}_4$ 溶液 1 mL $0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液 9 mL H_2O	指针偏转
	VII	X	10 mL $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{K}_2\text{SO}_4$ 溶液 10 mL $0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液	Y
	VIII	Z	10 mL $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{K}_2\text{SO}_4$ 溶液 10 mL H_2O	指针未见偏转

通过实验证实假设i合理, 将表中空白处的试剂或现象补充完整。

X _____; Y _____; Z _____。

高二年级化学试题 参考答案 2023.11.23

选择题（每题只有一个正确选项，每题 2 分，共 42 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	C	B	A	B	B	C	B	B	A	D	C	D
题号	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
答案	B	B	A	C	A	C	B	D	C			

22. (11 分)

(1) 250mL 容量瓶 (2) 酸式 (2 分)

(3) 80% (2 分)

(4) c. d (2 分)

(5) $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{Cl}^-) + c(\text{OH}^-)$

(6) B (7) a c (2 分)

23. (15 分)

(1) 还原 (2) 电子 (3) 正极

(4) $\text{Zn} - 2\text{e}^- = \text{Zn}^{2+}$ (5) $2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 + 4\text{e}^- = 4\text{OH}^-$ (6) ① 1.0×10^{-3} ② c ③ $1/2\text{V}_2$ (7) $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$, 水解吸热, 加热可以促进平衡正向移动, $c(\text{OH}^-)$ 增大, 碱性增强, 油脂更易水解 (2 分)(8) $\text{CaSO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$, 因为 CaCO_3 的溶解度小于 CaSO_4 , 加入 Na_2CO_3 , CO_3^{2-} 与 Ca^{2+} 生成 CaCO_3 , 平衡正移, [或加入 Na_2CO_3 使 $Q(\text{CaCO}_3) > K_{\text{sp}}(\text{CaCO}_3)$], CaSO_4 转化为 CaCO_3 , 与酸反应而除去 (2 分)(9) 5.1×10^{-4} (10) $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{Cl}^- + 2\text{HClO} + \text{CO}_2\uparrow$ (11) $c(\text{Na}^+) > c(\text{HCO}_3^-) > c(\text{CO}_3^{2-}) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$

24. (9 分)

(1) 溴水或酸性高锰酸钾溶液 (2) $\Delta H_2 - 2\Delta H_1$ (3) $T_3 > T_2 > T_1$

(4) 温度升高, 消碳反应速率增大的程度大于积碳反应速率增大的程度 (2 分)

(5) ① 反应 I ② 60% ③ 0.045 (2 分)

25. (11 分)

(1) HSO_3^- 在水溶液中既能发生电离: $\text{HSO}_3^- \rightleftharpoons \text{SO}_3^{2-} + \text{H}^+$, 又能发生水解:

$\text{HSO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{SO}_3 + \text{OH}^-$, 且电离程度大于水解程度 (2 分)

(2) c

(3) $3\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{Cr}(\text{OH})_3 + 4\text{NaOH} = 2\text{Na}_2\text{CrO}_4 + 8\text{H}_2\text{O}$

(4) H_2O_2 受热易分解, 所以氧化 $\text{Cr}(\text{OH})_3$ 的 H_2O_2 减少, 故能导致 Na_2CrO_4 的产率反而降低

(5) 加入 H_2SO_4 使得溶液中 H^+ 增大, 使得平衡 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}^+$ 逆向移动, 以提高 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 的产率 (2 分)

(6) ①滴入最后半滴 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液, 溶液由蓝色变为无色, 且半分钟内不恢复 (2 分)

② $\frac{59.6c_1 V_1}{3a} \%$ (2 分)

26. (12 分)

(1) ① $4\text{H}^+ + 4\text{I}^- + \text{O}_2 = 2\text{I}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ (1 分)

② 其他条件相同时 (1 分), O_2 能在酸性条件下将 I^- 氧化, 增大 $c(\text{H}^+)$ 使 I^- 被 O_2 氧化的速率加快 (1 分)

③ 升高温度或通入 O_2 (1 分)

④ 对照实验, 证明 SO_4^{2-} 对该反应的化学反应速率没有影响 (1 分)

(2) ii 增强 I^- 的还原性 (1 分)

X: 10 mL $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KI 溶液 10 mL H_2O (2 分)

Y: 指针偏转大于 VI (2 分)

Z: 10 mL $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KI 溶液

2 mL $0.2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ H_2SO_4 溶液、8 mL H_2O (2 分, 其他答案合理即给分, 除 10 mL $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KI 溶液外, 只需 H_2SO_4 溶液与水的体积相加等于 10 mL 即可, 或者 10 mL $0.2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ H_2SO_4 溶液也行)

北京高一高二高三期中试题下载

京考一点通团队整理了【**2023 年 10-11 月北京各区各年级期中试题 & 答案汇总**】专题，及时更新最新试题及答案。

通过【**京考一点通**】公众号，对话框回复【**期中**】或者点击公众号底部栏目<**试题专区**>，进入各年级汇总专题，查看并下载电子版试题及答案！

