

高三文科数学

考生注意：

1. 本试卷分选择题和非选择题两部分。满分 150 分，考试时间 120 分钟。
2. 答题前，考生务必用直径 0.5 毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3. 考生作答时，请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；非选择题请用直径 0.5 毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效，在试题卷、草稿纸上作答无效。
4. 本卷命题范围：集合、常用逻辑用语、函数、导数、三角函数、三角恒等变换、解三角形、平面向量。

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知 $p: \exists \theta \in (0, \pi), \sin \theta < 0$ ，则 $\neg p$ 为
 - $\exists \theta \in (0, \pi), \sin \theta \geq 0$
 - $\exists \theta \notin (0, \pi), \sin \theta < 0$
 - $\forall \theta \notin (0, \pi), \sin \theta < 0$
 - $\forall \theta \in (0, \pi), \sin \theta \geq 0$
2. 设集合 $A = \{x | y = \ln(x-3)\}$, $B = \{x | x \leq -1\}$, 则 $C_R(A \cup B) =$
 - $\{x | -1 \leq x \leq 3\}$
 - $\{x | -1 < x \leq 3\}$
 - $\{x | -1 \leq x < 3\}$
 - $\{x | -1 < x < 3\}$
3. 已知 $P(1, m)$ 是角 θ 的终边上一点, $\tan \theta = -2$, 则 $\sin \theta =$
 - $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$
 - $-\frac{\sqrt{5}}{5}$
 - $\frac{\sqrt{5}}{5}$
 - $\frac{2\sqrt{5}}{5}$
4. 已知平面向量 a, b 和实数 λ , 则 " $a = \lambda b$ " 是 " a 与 b 共线" 的
 - 充分不必要条件
 - 必要不充分条件
 - 充要条件
 - 既不充分也不必要条件
5. 扇子是引风用品, 夏令必备之物。我国传统扇文化源远流长, 是中华文化的一个组成部分。历史上最早的扇子是一种礼仪工具, 后来慢慢演变为纳凉、娱乐、观赏的生活用品和工艺品。扇子的种类较多, 受大众喜爱的有团扇和折扇。如图 1 是一把折扇, 是用竹木做扇骨, 用特殊纸或绫绢做扇面而制成的。完全打开后的折扇为扇形(如图 2), 若图 2 中 $\angle AOB = \theta$, C, D 分别在 OA, OB 上, $AC = BD = m$, \widehat{AB} 的长为 l , 则该折扇的扇面 $ABDC$ 的面积为



图 1




图 2

关注北京高考在线官方微信：京考一点通（微信号：bjgkzx），获取更多试题资料及排名分析信息。

A. $\frac{m(l-\theta)}{2}$

B. $\frac{m(l-\theta)m}{2}$

C. $\frac{m(2l-\theta)}{2}$

D. $\frac{m(2l-\theta)m}{2}$

6. 已知 $a = \left(\frac{3}{2}\right)^{-0.6}$, $b = \log_{\frac{1}{3}}\frac{1}{4}$, $c = \left(\frac{2}{3}\right)^{0.9}$, 则

- A. $b > c > a$
 B. $c > a > b$
 C. $b > a > c$
 D. $a > c > b$

7. 已知 $\sin\left(a - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{3}$, 则 $\sin\left(2a + \frac{\pi}{6}\right) =$

- A. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$
 B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$
 C. $\frac{2\sqrt{2}}{9}$
 D. $\frac{7}{9}$

8. 已知函数 $f(x) = -x^2 + ax + 1$ 在 $[1, 2]$ 上的最大值也是其在 $[1, 2]$ 上的极大值, 则 a 的取值范围是

- A. $[2, +\infty)$
 B. $[4, +\infty)$
 C. $[2, 4]$
 D. $(2, 4)$

9. 已知函数 $f(x) = \sqrt{3} \sin x \cos x + \sin^2 x - \frac{1}{2}$, 若将其图象向左平移 φ ($\varphi > 0$) 个单位长度后所得到的图象


关于原点对称, 则 φ 的最小值为

- A. $\frac{\pi}{12}$
 B. $\frac{\pi}{6}$
 C. $\frac{\pi}{3}$
 D. $\frac{\pi}{2}$

10. 如图, 已知两个单位向量 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 和向量 \overrightarrow{OC} , $|\overrightarrow{OC}| = \sqrt{2}$. \overrightarrow{OA} 与 \overrightarrow{OC} 的夹角为 θ , 且

$\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{10}$, \overrightarrow{OB} 与 \overrightarrow{OC} 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$, 若 $\overrightarrow{OC} = x \overrightarrow{OA} + y \overrightarrow{OB}$ ($x, y \in \mathbb{R}$), 则 $x - y =$

- A. -1
 B. $-\frac{1}{2}$
 C. $\frac{1}{2}$
 D. 1



11. 在 $\triangle ABC$ 中, D 为 BC 上一点, $\angle BAD = \angle CAD$, 若 $AC = AD = \frac{1}{2}AB = 2$, 则 $BC =$

- A. $2\sqrt{2}$
 B. $2\sqrt{3}$
 C. $3\sqrt{2}$
 D. $2\sqrt{5}$

12. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 \mathbb{R} , 若 $\forall x \in \mathbb{R}, f(4+x) + f(-x) = 0$, 且 $f(x+1)$ 为偶函数, $f(1) = -1$, 则 $f(2023) =$

- A. 1
 B. -1
 C. 2
 D. -2

二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. 函数 $f(x) = \log_a(x+1) + 2^x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的图象过定点 _____.

14. 已知向量 a, b 满足 $|a| = 5$, $|b| = 4$, a 与 b 的夹角为 120° , 若 $(ka - 2b) \perp (a + b)$, 则 $k =$ _____.

15. 已知函数 $f(x) = \frac{x-1}{e^x}$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 _____.

16. 函数 $y = \frac{\sin x - \cos x}{2 - \sin x \cos x}$ 的值域为 _____.

三、解答题:本题共 6 小题,共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本小题满分 10 分)

已知向量 $\mathbf{a} = (2\cos^2 x, \sin x)$, $\mathbf{b} = \left(\frac{1}{2}, \sqrt{3} \cos x\right)$, $f(x) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期和单调递减区间;

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, $A+B=\frac{7}{12}\pi$, $f(A)=1$, $BC=2\sqrt{3}$, 求边 AC 的长.

18. (本小题满分 12 分)

已知函数 $f(x) = \log_3(m^x + 1) - x$ ($m > 0$, 且 $m \neq 1$) 是偶函数.

(1) 求 m 的值;

(2) 若关于 x 的不等式 $\frac{1}{2} \cdot 3^{f(x)} - 3[(\sqrt{3})^x + (\sqrt{3})^{-x}] + a \leqslant 0$ 在 \mathbb{R} 上有解, 求实数 a 的最大整数值.

19. (本小题满分 12 分)

已知 $\sin \alpha$ 是方程 $5x^2 - 7x - 6 = 0$ 的根.

(1) 求 $\frac{\sin(-\alpha - \frac{3}{2}\pi) \cdot \cos(\frac{3}{2}\pi - \alpha) \cdot \cos(2\pi - \alpha) \cdot \tan(\pi - \alpha)}{\cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) \cdot \cos(\frac{\pi}{2} + \alpha)}$ 的值;

(2) 若 α 是第四象限角, $\sin(\beta - \frac{\pi}{6}) = \frac{5}{13}$ ($0 < \beta < \frac{\pi}{2}$), 求 $\sin(\alpha - \beta + \frac{\pi}{6})$ 的值.

20. (本小题满分 12 分)

已知函数 $f(x) = a \ln x - x$ ($a \in \mathbb{R}$).

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;


(2) 若 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{e}, e^2\right]$ 上有 2 个零点, 求 a 的取值范围.

21. (本小题满分 12 分)

南京玄武湖号称“金陵明珠”, 是我国仅存的皇家园林湖泊. 在玄武湖的一角有大片的荷花, 每到夏季, 荷花飘香, 令人陶醉. 夏天的一个傍晚, 小胡和朋友游玄武湖, 发现观赏荷花只能在岸边, 无法深入其中, 影响观赏荷花的乐趣, 于是他便有了一个愿景: 若在玄武湖一个盛开荷花的一角(该处岸边近似半圆形, 如图所示)设计一些栈道和一个观景台, 观景台 P 在半圆形的中轴线 OC 上(图中 OC 与直径 AB 垂直, P 与 O, C 不重合), 通过栈道把 PA, PB, PC, AB 连接起来, 使人行在其中, 犹如置身花海之感. 已知 $AB=200$ m, $\angle PAB=\theta$, 栈道总长度为函数 $f(\theta)$.

(1) 求 $f(\theta)$;

(2) 若栈道的造价为每米 5 万元, 试确定观景台 P 的位置, 使实现该愿景的建造费用最小(观景台的建造费用忽略不计), 并求出实现该愿景的建造费用的最小值.



22. (本小题满分 12 分)

在锐角 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , S 为 $\triangle ABC$ 的面积, 且 $a^2=2S+(b-c)^2$.

(1) 求 $\tan A$ 的值;

(2) 若 $a=8$, 证明: $16 < b+c \leqslant 8\sqrt{5}$.

高三文科数学参考答案、提示及评分细则

1. D 由含有量词的命题的否定的特点知 $\neg p$ 为“ $\forall \theta \in (0, \pi), \sin \theta \geqslant 0$ ”. 故选D.
2. B 由题意得 $A = \{x | x > 3\}, A \cup B = \{x | x \leqslant -1, \text{或} x > 3\}$, 则 $C_R(A \cup B) = \{x | -1 < x \leqslant 3\}$. 故选B.
3. A 由三角函数的定义知 $\tan \theta = m = -2$, 所以 $\sin \theta = -\frac{2}{\sqrt{5}} = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$. 故选A.
4. A 若 $a = \lambda b$, 由共线向量定理知 a 与 b 共线, 知“ $a = \lambda b$ ”是“ a 与 b 共线”的充分条件; 若 a 与 b 共线, 如 $a = (1, 2), b = (0, 0)$, 则 $a = \lambda b$ 不成立, 故“ $a = \lambda b$ ”不是“ a 与 b 共线”的必要条件. 综上, “ $a = \lambda b$ ”是“ a 与 b 共线”的充分不必要条件. 故选A.
5. D 由弧长公式可知, $l = \theta \cdot OA$, 所以 $OA = \frac{l}{\theta}$, 则 $OC = \frac{l}{\theta} - m$, 所以该折扇的扇面的面积为 $\frac{1}{2} l \cdot \frac{l}{\theta} - \frac{1}{2} \theta \cdot (\frac{l}{\theta} - m)^2 = \frac{m(2l - m\theta)}{2}$. 故选D.
6. C $1 = (\frac{3}{2})^0 > (\frac{3}{2})^{-0.6} = (\frac{2}{3})^{0.6} > (\frac{2}{3})^{0.9}$, 即 $1 > a > c$, 又 $\log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{4} = \log_3 4 > 1$, 所以 $b > a > c$. 故选C.
7. D $\sin(2\alpha + \frac{\pi}{6}) = \sin[2(\alpha - \frac{\pi}{6}) + \frac{\pi}{2}] = \cos 2(\alpha - \frac{\pi}{6}) = 1 - 2\sin^2(\alpha - \frac{\pi}{6}) = 1 - 2 \times \frac{1}{9} = \frac{7}{9}$. 故选D.
8. D $f'(x) = a - 2x$, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = \frac{a}{2}$, 由题意得 $\frac{a}{2} \in (1, 2)$, 所以 $a \in (2, 4)$. 故选D.
9. A 因为 $f(x) = \sqrt{3} \sin x \cos x + \sin^2 x - \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} \cos 2x = \sin(2x - \frac{\pi}{6})$, 将其图象向左平移 φ ($\varphi > 0$)个单位长度后得到函数 $y = \sin(2x + 2\varphi - \frac{\pi}{6})$ 的图象, 因为 $y = \sin(2x + 2\varphi - \frac{\pi}{6})$ 的图象关于原点对称, 所以 $2\varphi - \frac{\pi}{6} = k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$, 即 $\varphi = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}$ $(k \in \mathbb{Z})$, 由于 $\varphi > 0$, 当 $k=0$ 时, φ 取得最小值 $\frac{\pi}{12}$. 故选A.
10. B 由 $\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{10}, \theta \in [0, \pi]$, 得 $\sin \theta = \sqrt{1 - (\frac{\sqrt{2}}{10})^2} = \frac{7\sqrt{2}}{10}$, 所以 $\cos(\theta + \frac{\pi}{4}) = -\frac{3}{5}$, 由题意得 $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = 1 \times \sqrt{2} \cos \frac{\pi}{4} = 1, \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} = 1 \times \sqrt{2} \cos \theta = \frac{1}{5}, \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -\frac{3}{5}$, 在 $\overrightarrow{OC} = x \overrightarrow{OA} + y \overrightarrow{OB}$ 两边分别点乘 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$, 得 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} = x \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} + y \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = x - y = \frac{1}{5}, \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = x \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} + y \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OB} = -\frac{3}{5}x + y = -\frac{3}{5}$, 两式联立并解得 $\begin{cases} x = \frac{5}{4}, \\ y = \frac{7}{4}. \end{cases}$ 所以 $x - y = -\frac{1}{2}$. 故选B.
11. C 设 $\angle BAC = \theta$, 由 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle BAD} + S_{\triangle CAD}$, 得 $\frac{1}{2} AB \cdot AC \sin \theta = \frac{1}{2} AB \cdot AD \sin \frac{\theta}{2} + \frac{1}{2} AC \cdot AD \sin \frac{\theta}{2}$, 即 $2 \sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} + \sin \frac{\theta}{2}$, 所以 $4 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} = 3 \sin \frac{\theta}{2}$, 因为 $\theta \in (0, \pi)$, 所以 $\sin \frac{\theta}{2} \neq 0$, 所以 $\cos \frac{\theta}{2} = \frac{3}{4}$, 所以 $\cos \theta = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} - 1 = \frac{1}{8}$, 所以 $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos \theta = 16 + 4 - 2 \times 4 \times 2 \times \frac{1}{8} = 18$, 所以 $BC = 3\sqrt{2}$. 故选C.
12. A 因为 $f(x+1)$ 为偶函数, 即 $f(-x+1) = f(x+1)$, 所以 $f(x) = f(2-x)$, 又由 $f(4+x) + f(-x) = 0$, 所以 $f(x+2) = -f(2-x) = f(x)$, 所以 $f(x+4) = f(x)$, 故 $f(x)$ 为周期函数且4是一个周期, 所以 $f(2023) = f(3) = -f(1) = 1$. 故选A.
13. (0,1) 当 $x=0$ 时, a 在 $(0,1) \cup (1,+\infty)$ 上无论取何值, $f(x)$ 的值总为1, 故函数 $f(x)$ 的图象过定点 $(0,1)$.
14. $\frac{4}{5}$ 因为 $|a| = 5, |b| = 4, a$ 与 b 的夹角为 120° , 所以 $a \cdot b = |a||b|\cos 120^\circ = 5 \times 4 \times (-\frac{1}{2}) = -10$. 由 $(ka - 2b) \perp (a + b)$, 得 $(ka - 2b) \cdot (a + b) = ka^2 - 2b^2 + (k-2)a \cdot b = 25k - 2 \times 16 - 10(k-2) = 15k - 12 = 0$, 解得 $k = \frac{4}{5}$.

关注北京高考在线官方微信 【高者一点通】(微信号:bjgkzx) 获取更多试题资料及排名分析信息。



15. $2x-y-1=0$ $f'(x)=\frac{e^x-(x-1)e^x}{(e^x)^2}=\frac{2-x}{e^x}$, 所以 $f'(0)=2$, 又 $f(0)=-1$, 故所求切线方程为 $y-(-1)=2(x-0)$, 即 $2x-y-1=0$.

16. $\left[-\frac{2\sqrt{2}}{5}, \frac{2\sqrt{2}}{5}\right]$ 令 $t=\sin x-\cos x$, 则 $\sin x \cos x=\frac{1-t^2}{2}$ ($-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$), 所以 $y=\frac{2t}{3+t^2}$ ($-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$), 当 $t=0$ 时, $y=0$, 当 $-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$, 且 $t \neq 0$ 时, $y=\frac{2}{t+\frac{3}{t}}$, 令 $u=t+\frac{3}{t}$, 易知 u 的值域为 $(-\infty, -\frac{5\sqrt{2}}{2}] \cup [\frac{5\sqrt{2}}{2}, +\infty)$, 所以 $y=\frac{2}{t+\frac{3}{t}}$ 的取值范围为 $\left[-\frac{2\sqrt{2}}{5}, 0\right) \cup \left(0, \frac{2\sqrt{2}}{5}\right]$. 综上所述, 所求函数的值域为 $\left[-\frac{2\sqrt{2}}{5}, \frac{2\sqrt{2}}{5}\right]$.

17. 解: (1) 由题意得 $f(x)=\cos^2 x + \sqrt{3} \sin x \cos x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) + \frac{1}{2}$, 2 分

所以 $f(x)$ 的最小正周期 $T=\frac{2\pi}{2}=\pi$, 3 分

令 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{6} \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), 得 $\frac{\pi}{6} + k\pi \leq x \leq \frac{2\pi}{3} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), 4 分

所以 $f(x)$ 的单调递减区间为 $\left[\frac{\pi}{6} + k\pi, \frac{2\pi}{3} + k\pi\right]$ ($k \in \mathbb{Z}$). 5 分

(2) 由(1)知 $f(A)=\sin\left(2A + \frac{\pi}{6}\right) + \frac{1}{2}=1$,

所以 $\sin\left(2A + \frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$, 又 $A \in (0, \pi)$, 所以 $2A + \frac{\pi}{6} \in (\frac{\pi}{6}, \frac{13\pi}{6})$, 所以 $2A + \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$, 所以 $A = \frac{\pi}{3}$ 7 分

因为 $A+B=\frac{7}{12}\pi$, 所以 $B=\frac{\pi}{4}$, 8 分

由正弦定理得 $\frac{AC}{\sin B} = \frac{BC}{\sin A}$, 所以 $AC = \frac{BC \sin B}{\sin A} = \frac{2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2\sqrt{2}$ 10 分

18. 解: (1) 因 $f(x)$ 为偶函数, 所以 $f(x)=f(-x)$ 对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立,

即 $\log_3(m^{-x}+1)+x=\log_3(m^x+1)-x$ 对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立, 2 分

又 $\log_3(m^{-x}+1)=\log_3\frac{m^x+1}{m^x}=\log_3(m^x+1)-\log_3 m^x=\log_3(m^x+1)-x \log_3 m$,

所以 $\log_3(m^x+1)-x \log_3 m+x=\log_3(m^x+1)-x$ 对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立, 4 分

即 $x(\log_3 m-2)=0$ 对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立,

必须 $\log_3 m-2=0$, 即 $m=9$.

故 $m=9$ 6 分

(2) 由(1)知, $f(x)=\log_3(9^x+1)-x$,

故 $3^{f(x)}=3^{\log_3(9^x+1)-x}=3^x+\frac{1}{3^x}$ 7 分

设 $t=(\sqrt{3})^x+(\sqrt{3})^{-x}$ ($t \geq 2$), 则 $t^2=3^x+\frac{1}{3^x}+2$, 即 $3^x+\frac{1}{3^x}=t^2-2$,

所以原问题等价于关于 t 的不等式 $\frac{1}{2}t^2-3t+a-1 \leq 0$ 在 $[2, +\infty)$ 上有解,

所以 $a \leq \left(-\frac{1}{2}t^2+3t+1\right)_{\max}$, 9 分

又 $y=-\frac{1}{2}t^2+3t+1=-\frac{1}{2}(t-3)^2+\frac{11}{2}$, $t \in [2, +\infty)$, 10 分

所以当 $t=3$ 时, $y_{\max}=\frac{11}{2}$,

所以 $a \leq \frac{11}{2}$, 故实数 a 的最大整数值为 5. 12 分

关注北京高考在线官方微信: 京考一点通 (微信号:bjgkzx), 获取更多试题资料及排名分析信息。

19. 解:(1)由 $\sin \alpha$ 是方程 $5x^2 - 7x - 6 = 0$ 的根, 得 $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$ 或 $\sin \alpha = 2$ (舍), 1分

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{-\sin\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right) \cdot \cos\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right) \times \cos \alpha \times (-\tan \alpha)}{\sin \alpha \times (-\sin \alpha)} = \frac{\cos \alpha (-\sin \alpha) \cos \alpha (-\tan \alpha)}{-\sin^2 \alpha} \\ &= \frac{\cos \alpha \cos \alpha \times \left(-\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}\right)}{\sin \alpha} = -\cos \alpha, \end{aligned} \quad \text{3分}$$

由 $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$, 所以 α 是第三象限或第四象限角,

若 α 是第三象限角, 则 $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$, 此时 $-\cos \alpha = \frac{4}{5}$; 4分

若 α 是第四象限角, 则 $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, 此时 $-\cos \alpha = -\frac{4}{5}$ 5分

故所求式子的值为 $\frac{4}{5}$ 或 $-\frac{4}{5}$ 6分

(2)由(1)知, 当 α 是第四象限角时, $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$, $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, 7分

由 $\sin\left(\beta - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{5}{13}$ ($0 < \beta < \frac{\pi}{2}$), 得 $\cos\left(\beta - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{12}{13}$, 8分

所以 $\sin\left(\alpha - \beta + \frac{\pi}{6}\right) = \sin[\alpha - (\beta - \frac{\pi}{6})]$ 10分

$$= \sin \alpha \cos\left(\beta - \frac{\pi}{6}\right) - \cos \alpha \sin\left(\beta - \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{3}{5} \times \frac{12}{13} - \frac{4}{5} \times \frac{5}{13} = -\frac{56}{65}. \quad \text{12分}$$

20. 解:(1)函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 且 $f'(x) = \frac{a}{x} - 1 = \frac{a-x}{x}$ ($x > 0$). 1分

当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) < 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减; 2分

当 $a > 0$ 时, 令 $f'(x) > 0$ ($x > 0$), 得 $0 < x < a$, 令 $f'(x) < 0$, 得 $x > a$, 3分

所以 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上单调递增, 在 $(a, +\infty)$ 上单调递减. 4分

综上所述, 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减; 当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上单调递增, 在 $(a, +\infty)$ 上单调递减. 5分

(2)若 $a=0$, $f(x) = -x$, 在 $[\frac{1}{e}, e^2]$ 上无零点, 不合题意; 6分

若 $a \neq 0$, 由 $f(x) = 0$, 得 $\frac{1}{a} = \frac{\ln x}{x}$, 7分

令 $g(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则直线 $y = \frac{1}{a}$ 与函数 $g(x)$ 在 $[\frac{1}{e}, e^2]$ 上的图象有两个交点, 8分

$g'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$, 当 $\frac{1}{e} < x < e$ 时, $g'(x) > 0$, 当 $e < x < e^2$ 时, $g'(x) < 0$, 所以 $g(x)$ 在 $[\frac{1}{e}, e]$ 上单调递增, 在 $[e, e^2]$ 上单调递减. 9分

所以 $g(x)_{\max} = g(e) = \frac{1}{e}$,

又 $g\left(\frac{1}{e}\right) = -e$, $g(e^2) = \frac{2}{e^2}$, 10分

所以要使直线 $y = \frac{1}{a}$ 与 $g(x)$ ($x \in [\frac{1}{e}, e^2]$) 的图象有两个交点, 则 $\frac{2}{e^2} \leq \frac{1}{a} < \frac{1}{e}$, 11分

所以 $e < a \leq \frac{e^2}{2}$, 即实数 a 的取值范围为 $(e, \frac{e^2}{2}]$ 12分

21. 解:(1)由题意知 $\angle PAB = \theta$, $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$, $OC \perp AB$, $OA = OB = 100$, 1分

则 $PA = PB = \frac{100}{\cos \theta}$, $PO = 100\tan \theta$, 所以 $PC = 100 - 100\tan \theta$, 3分

所以 $f(\theta) = PA + PB + PC + AB = \frac{200}{\cos \theta} + 100 - 100\tan \theta + 200 = 100\left(\frac{2-\sin \theta}{\cos \theta} + 3\right)$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{4}$). 4分

(2)建造栈道的费用 $F(\theta) = 5f(\theta) = 500\left(\frac{2-\sin \theta}{\cos \theta} + 3\right)$, 5分

关注北京高考在线官方微信: 京考一点通 (微信号:bjgkzx), 获取更多试题资料及排名分析信息。

$$F'(\theta) = 500 \times \frac{2\sin\theta - 1}{\cos^2\theta}, \dots \quad 6 \text{分}$$

令 $F'(\theta) = 0$, 得 $\sin\theta = \frac{1}{2}$, 又 $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$, 所以 $\theta = \frac{\pi}{6}$. \dots \quad 7 \text{分}

当 $0 < \theta < \frac{\pi}{6}$ 时, $F'(\theta) < 0$, 当 $\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{\pi}{4}$ 时, $F'(\theta) > 0$,

所以 $F(\theta)$ 在 $(0, \frac{\pi}{6})$ 上单调递减, 在 $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4})$ 上单调递增, \dots \quad 9 分

所以 $F(\theta)_{\min} = F\left(\frac{\pi}{6}\right) = 500(3 + \sqrt{3})$, 此时 $PC = 100 - 100\tan\frac{\pi}{6} = 100 - \frac{100\sqrt{3}}{3}$, \dots \quad 11 分

故观景台位于离岸边半圆弧中点距离为 $\left(100 - \frac{100\sqrt{3}}{3}\right)$ 米时, 建造费用最小, 最小费用为 $500(3 + \sqrt{3})$ 万元. \dots \quad 12 分

22. (1) 解: 因为 $\triangle ABC$ 的面积为 $S = \frac{1}{2}bc\sin A$, $2S = a^2 - (b - c)^2$,

所以 $bc\sin A = a^2 - b^2 - c^2 + 2bc$, \dots \quad 1 分

由余弦定理, 得 $a^2 - b^2 - c^2 = -2bcc\cos A$, \dots \quad 2 分

所以 $bc\sin A = 2bc - 2bcc\cos A$, 因为 $bc \neq 0$,

所以 $\sin A + 2\cos A = 2$, \dots \quad 3 分

又 $A \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$, 所以 $\sin A + 2\sqrt{1 - \sin^2 A} = 2$, \dots \quad 4 分

化简得 $5\sin^2 A - 4\sin A = 0$, 解得 $\sin A = \frac{4}{5}$ 或 $\sin A = 0$ (不合题意, 舍去). \dots \quad 5 分

因为 $A \in (0, \frac{\pi}{2})$, 所以 $\cos A = \sqrt{1 - \sin^2 A} = \frac{3}{5}$, $\tan A = \frac{\sin A}{\cos A} = \frac{4}{3}$, \dots \quad 6 分

关于我们

北京高考在线创办于 2014 年，隶属于北京太星网络科技有限公司，是北京地区极具影响力中学升学服务平台。主营业务涵盖：北京新高考、高中生涯规划、志愿填报、强基计划、综合评价招生和学科竞赛等。


北京高考在线旗下拥有网站门户、微信公众平台等全媒体矩阵生态平台。平台活跃用户 50W+，网站年度流量数千万量级。用户群体立足于北京，辐射全国 31 省市。

北京高考在线平台一直秉承“精益求精、专业严谨”的设计理念，不断探索“K12 教育+互联网+大数据”的运营模式，尝试基于大数据理论为广大中学和家长提供新鲜的高考资讯、专业的高考政策解读、科学的升学规划等，为广大高校、中学和教科研单位提供“衔接和桥梁纽带”作用。

平台自创办以来，为众多重点大学发现和推荐优秀生源，和北京近百所中学达成合作关系，累计举办线上线下升学公益讲座数千场，帮助数十万考生顺利通过考入理想大学，在家长、考生、中学和社会各界具有广泛的口碑影响力

未来，北京高考在线平台将立足于北京新高考改革，基于对北京高考政策研究及北京高校资源优势，更好的服务全国高中家长和学生。

推荐大家关注北京高考在线网站官方微信公众号：**京考一点通**，我们会持续为大家整理分享最新的高中升学资讯、政策解读、热门试题答案、招生通知等内容！



官方微博账号：京考一点通
官方网站：www.gaokzx.com

咨询热线：010-5751 5980
微信客服：gaokzx2018